Natural history of
New York. Zoology.
By James e de Kay
1842 4to

Genera of Mammalia in the State of New York by James E. Kay.

Ordo	Familia	Genera
Marsupiata	Didelphidae	Didelphis
Carnivora	Vespertilionidae	Vespertilio
	Soricidae	Condylura
		Scalops
		Sorex
		Otisorex
	Ursidae	Ursus
		Procyon
		Gulo
	Mustelidae	Mephitis
		Mustela
		Putorius
	Lutridae	Lutra
	Canidae	Canis
		Lupus
		Vulpes
	Felidae	Felis
		Lyncus
	Phocidae	Phoca
		Stenatopus
Rodentia	sciuridae	Sciurus
		Pteromys
	Arctomidae	Arctomys.
	Genbillidae	Merione
	Castoridae	Castor
		Fiber
	Hystricidae	Hystrix
	Muridae	Mus
		arvicola
	Leporidae	Lepus
	Elephantidae	Elephas
		Mastodon
Ungulata	Suidae	Sus
	Equidae	Equus
	Bovidae	Bos
	Capridae	Ovis
	Cervidae	Cervus
		Elaphus
		Ranzifer

Cetacea — Balaenidae — { Balaena, Physeter, Bonqualus }

Delphinidae { Globicephalus, Phocaena, Delphinus }

Ursidae — Ursus americanus Pall. VI fig 1.
extra { ferox Say
maritimus
Procyon Lotor L. VI fig 2
extra Meles labradoria
Gulo Luscus L. XII fig 2

Mustelidae — Mephitis americana XII fig 1 Lin.
viverra Mephitis

XXXIII fig 1 2 3. Mustela canadensis L XIII fig 1.
XIX 2 – XI fig 2 — martes L
— pusilla Richn XIV fig 1 et 2. noveb.
— vulgaris L
— fusca Bachm
extra. — frenata Lichtenst. Bach

XIV fig 2. Putorius noveboracensis XIII f 2
XI — vison L VIII f: 3 m. Erminea Kan

Lutridae — Lutra canadensis Sab. III fig 1.
extra — lataxina Fr. Cuv
Enchydra Lutris L.

Canidae — Canis familiaris
XXVII f 2 Lupus occidentalis (Gray Wolf)
~~extra~~ Vulpes fulvus Desmar. VII. f. 1
— virginianus LS. VII f. 2.

Marsupiata
Didelphidae XV fig 2 Didelp. virginia.

Carnivora.
Vespertilionidae
I fig 2 – Vesp. noveboracensis L.
II fig 2 — pruinosus Say.
III fig 2 — subulatus. Say.
I fig 1. — noctivagus Le Conte
II f 1 — carolinensis Geoff
extra { — monticole Bachm.
— virginianus —
mollosus cynocephalus Geoff.
— fuliginosus —
Plecotus lecontii —
— townsendi —

Soricidae IIII fig 1 Condylura cristata L.
IV fig 2 Scalops aquaticus L.
V fig 2. Sorex DeKayi. Bachm
— brevicaudus Say
— parvus Say
XXI. f 3. — forsteri ~~Richardson~~
XXI f 2 — carolinensis Bachm
extra { — cinerus Bachm
— richardsoni —
— Cooperi —
— fimbripes —
— palustris Richardson

extra Vulpes velox Say

Felidae Felis concolor. L. IX

X fig 2 Lynchus borealis sehr kurzen Schweif Lenn F. canadensis

— rufus X fig. 1 längeren Schweif

Phocidae Phoca concolor XVIII fig 2

XV fig 1. Stematopus cristatus Phoc crist. L. S.

extra Trichechus Rosmarus L.

V fig 1. Otisorex Platyrhinus

extra — longirostris Bachm

Muridae Mus Decumanus L.
— Rattus L
— americanus XXI. i.
— mycalus
XXIII f. i. — leucopus Rich
XXII f 2 auricola riparius ord.
XXII f i — rufescens
— hirsutus Emmons
XXV. f i — oneida
XXIV. f i. — rufescens Emmons
XXIII f 2 — xanthographus Leach
extra — pennsylvanicus Rich
— borealis. —
— noveboracensis —
— nuttalli. Harlan
— pinetorum Le Conte
— gapperi
— ferrugineus Harlan
— richardsonii
— rubricatus Bachy
Neotoma floridanus Say
— drummondi Rich
Sigmodon hortense Say
Geomychus helveolus Rich
— trimucronatus, hudsonius, groenlandius

Rodentia

Sciuridae XVIII f i i Sciurus leucotis Gapper vel cinereus
— Vulpinus Sm
XVII f i i. — niger Say
XVIII f i 2 — hudsonicus Bean
XVI f i i. — striatus Lin
extra — carolinensis
— macrourus Say
— quadrivittatus Say
— fuliginosus Bachm
— richardsonii —
— douglasii —
— capistratus
— lanuginosus Bachm
— nigrescens —
— collei Richards.
XVI f i 2 Pteromys volucella Hard
extr. — sabrinus Richard.
— oregonensis Bach

aplodontia leporina Rich
Geomys douglasi Rich
— umbrinus —
— talpoides —
— bulbivorus —
— bursarius — Say
— borealis Bachm
— townsendi —
Leporidae XXVII. fig 1; Lepus nanus Schr americ: Desm.
XXVI fig 2 — americanus Rich...
extra — glacialis Leach
— aquaticus Bachm
— palustris —
— campestris Rich
— longicaudatus Gray
— nigricaudatus — Bachm
— californicus Gray
— richardsoni Bachm
— townsendi —
— artemesia —
— Bachmanni —
Lagomys princeps Richards

Arctomidae
extra Spermophilus tredecim-lineatus Mitt.
— lateralis Say
— douglasii Rich.
— beecheyi R —
— francolini —
— Richardsoni Sabine
— grammurus Say
— guttatus Tem Richards
— parryi —
— ludovicianus Godm
XXI f 4. Arctomys monax L.
extra — empetra Rich
— pruinosus —
— brachyurus Harlem.
Gerbillidae XXIV f 2 Meriones americanus Bart.
Castoridae XX 1. Castor fiber L VIII fig 1
XXXII fig 1 XX. 2 fiber Zibethicus L
Hystricidae Hystrix hudsonius. dorsatus Brisson
VIII fig 2 XXVI fig 1

Peregrinatoris intrepidi & naturae scrutatoris indefessi

Memoriae consecrat

Marci Palatini Praefectus.



N 5

Ungulata

Suidae Sus Scrofa domest.

Equidae Equus caballus

— asinus

extra — major. Fossil.

Bovidae Bos Taurus

extra — moschatus Zadm.

— bombifrons Harl.

— latifrons Harl.

— pallasii Ray

Bison americanus Godm

Caprideae Ovis. Aries L.

extr. — montana Richards.

Capra Hircus.

— americana Blainv.

Antilope americana Godm

~~XXVIII~~ f:. Cervidae Cervus virginianus Ray

~~XXIX~~ f:. 2 — alces L.

extra — macrotis Richards

— canadensis —

— nemoralis Smith

Peregrinatoris intrepidi & naturae scrutatoris indefessi
Memoriae consecrat
Musei Palatini Praefectus.

XXVIII fig 2 Elaphus canadensis. Wapiti Bart.

Rangifer Tarandus L S.

Cetacea

extra Manatidae

XXXII f 4. XXX. fig 2 Manatus americanus.

— latirostris Harl.

—

Zeuglodon harlani Owen

XXXI fig 3 Balaenidae Balaena Mysticetus

XXXI fig 2 Physeter macrocephalus

XXX f 1 Borqualus rostratus Balaena.

XXXIII fig 4 — australis

— borealis. Boops

XXX f 3 Delphinidae globicephalus melas Trail

Phocaena communis

XXXII fig 1. — orca Fabr

XXXI. fig 1 Delphinus delphis L

entre — calventensis Harl

21
48.
168.
84
1008.
48.
10,56.

Coracias scutata - 75 - monostom.
etlich - amphistom 94
179

caprimulgus rufus. 1 f - mit 2 Taenia i 10 Stück
zerschnitt 1 capillaria, einige Distomen
od. Monostomen —

Muscicapa Pepoaza. 1 ms nichts —

Lanius Brugara. schwach reißgeschrecket — 1 ms
mit 4 Ascarid aus d. Dammkanal.

Trochilus longirostris nichts 1 ms —
Columba Picius nichts. 2 ms —
Muscicap. tyrannus — nichts —
Hirundo - campestris. nichts — 1 ms
— a venti jaune 4 Taenien —
Numenius phaeopus Taeniae
Morrad. - pluvialis. nichts —

~~Miguel ½ P~~
Manoel – 3 P –
João Ribeiro – 3 P – 4 –
Jos Pinto – ½ Haut und – 1 Pat –
~~Joaquim – 12 Pat –~~
Bernard – 12 P – L. 3 P für Haut
João Ribeiro – 13/000 – Reis
an ~~Miguel 3 P –~~
~~6 P. für ein glaubig~~
an Bento – 18 Pat –
Lionel. 21. Okt 6 aufg. à 10 P – – vers. 2 Tag

Nadeln augen – Mercur –
Magl = Gold – Flöhren.

waren, müßen von Spitze zu Spitze
nicht weniger als 12 Fuß". — Dieser
letzte Nachricht scheint keinesweges
die natürliche Größe zu überschreiten
seit ~~als~~ dem wir eine Nachricht
in den Philosophical Transactions von
einigen ~~Fed~~ aus Chili gebrachten
Federkielen dieses Vogels haben
welche 2 Fuß 4 Zoll, der Durch-
messer des Kiels ½ Zoll und die
Breite der Flügel 16 Fuß. Dieser
Vogel wurde in der Breite 33 S.
nicht weit von der Insel Mocha
in der Südsee im Jahr 1691 angetroffen
— In dieser Nachricht erfahren
wir, daß die Farbe weiß und
schwarz war, wie eine Elster, und
die Haube oder Kamm, scharf
wie ein Barbiermesser.

Lohnort. Man vermuthete, daß
diese Vögel in Südamerika zu
Hause waren; aber Buffon glau

sie seyen gleichfalls Einwohner von Asien und ~~Europa~~ Africa, und nicht unwahrscheinlich auch von Europa, wenn der Lämmergeyer der Deutschen der nähmliche Vogel ist, welches er (Russen) geneigt zu glauben scheint und daß der Roc oder Ruch von dem in den arabischen Mährchen öfters Meldung geschieht auch beweisen könnte daß er der nähmliche sey: —

Alberto Fortis, in seinen Reisen nach Dalmatien im Jahr 1778 p. 245 sagt, daß er selbst einen Geyer maaß (one found near the mouth of Cettina) dessen Flügel Breite mehr als 12 Fuß war; und in einer Note sagt er unten, daß die ~~Gattung~~ Art die in den Schweitzer Gebirgen gefunden wird, ~~zu~~ mit Nahmen Vautour des Alpes, von der nähmlichen Gattung ~~wäre~~ ist.

Wir verbündeten erfahren ferner, daß die Kehle des Kondur nackt ist ohne Federn und von einer rothen Farbe; der Kamm braun, aber nicht gezackt (eingeschnitten); daß bey einigen, die obern Theile ~~mit~~ schwarz, grau, und weiß bunt, und unter dem Bauch scharlachfarb, wie jener durch M. Salerne angeführten Vogel war.

M. Brisson bemerkt, daß diese Vögel in der Farbe variiren, welches für die Ursache der Verschiedenheit im Gefieder, womit die Auctoren sie beschrieben haben angegeben wird, welcher Umstand bey andern Vögeln eben so gut sich ereignet, als in dieser Gattung.

Crested. Vultur harpya Li
L'aigle huppé du Bresil. Briss.
Urutaurana Raji Sinopsis
Oronooko Eagle Brown.

Columba palumbus nichts –

Gadus – Codfish – 1 ♂ mit

sehr viele Rundw. in Kapseln aufgefasst auf dem Magen und Darmkanal anhängend –

2 langen und 16. kurze Rundw. aus d. Magen, einer von den langen war todt – vielleicht parasitisch –

2 lang. Bothriocephalis – aus d. Darmkanal mit den Kopfen steckt sie jeder in einem abgestorbenen entzündeten Apendix pilorius.

und mehrere Rundwürmer aus d. Darmkanal

Leptopilos marabu. 4 ♂ mit –

? ? Wurmähnliche Dinge. auf der muskulösen Haut auf d. Brust und Kopf am Schnabel – ein Theil dieser Haut folgt mit –

Larus furus 1 m. mit 6. Dist. aus d. Darmkanal

Salmo salar. Salmon. Lachs – 1 ♂ mit

1. langen Taenia – aus d. Darmkanal, doch stak sie in etwa 5 Apendix pyl. zusammengebogen auf das Meist [illegible] –

viele Rundw. aus d. Darmkanal besonders in den Apenddictus –

kleine geflekte Dissen eben daher

Platalea leucorodia Ks mnsb

Platalea leucorodia [illegible]

J. M. GOUDSMIT Jr.,

GEADMITTEERD

MOND-, KIES- en TANDMEESTER,

Woond op het korte Visschersdijk, het tweede huis van de groote Zeevismarkt, Wijk B, No. 329.

te Rotterdam.

NB. De Armen worden zoo als gewoon, gratis bediend.

Nov. London 1835.

Tetrao Scoticus 1 ms nichts.

29. Tetrao Scoticus. 1 ms mit kleinen Rundwürmern aus den langen Blinddärmen. 1 f. nichts.

Perdix rufa 1 m. 1 f. nichts.

Haematopus ostralegus 1 ms. nichts.

Tetrao scoticus. 1 ms nichts.

Decbr.

6. Tetrao scoticus. 1 ms nichts

Tet. scoticus 1 f. mit 12 fragmenten von Taenien zwey davon mit Kopfende aus dem Dünndarmen.

— Psittacus guaruba. 1 ms nichts.

8. Tetrao scoticus 1 f nichts.

11. Tetrao lagopus. 1 ms. nichts

Tetrao Scoticus 1 ms. nichts

Tetrao scoticus. 1 mis, mit sch. kleinen Rundwürmern aus d. Blinddärmen.

Tetrao scoticus 1 f. nichts

Perdix rufa 2 fo. nichts.

Nov.	Lond
	Tetrao
29.	Tetrao sco aus dem ca
	Perdix ru
	Haematop
	Tetrao sco
Decbr 6.	Tetrao sc
	Tet. scotic Taenien dünndarm
—	Psittacus g
8.	Tetrao scot
11.	Tetrao lagop
	Tetrao scot
	Tetrao scotic wärmern
	Tetrao scotic
	Perdix rufa

Dec.

25. Larus ridibundus 1 ms mit
+ 15 fragmenten von Taenien aus d. darmkanal
bloß nur mit kostend

L. = 1 ms nichts

+ Larus canus 1 ms mit 1 fragment von 1 Taenia ohne
kost aus d. darmkanal –

Lar. canus 1 f. nichts –

Tulica atra nichts 2 f –

Corvus cornix nichts –

26. Larus canus – 1 f. mit
+ 4 fragmenten von Taenien aus dem Dünndarm
nur weniger ohne kost –

Larus canus –

Larus marinus –

+ Cereopsis – novae Hollandiae 1 f. mit
vielen Rundwürmern aus beyden Blinddärmen

Cygnus Bewikii anas cygnus 1 f. mit
+ 3 Distomen aus beyden Blinddärmen –

Jan.

Pleuronectus f

1. mu

Raja – m

Anas albifron

+ 8. röthl. Spr

– 2 Taenien

– 6 Distomen

– Pleuronectes f

Gadus –

+ 6. Rindw. a

Trigla cuc

13. Pleuronectes

———

waren schon

14 – Larus mar

+ fragment
aus dem

13. Tetrao scotic

– Columba oe

– Phas. colchic

kürzer

schwarz wie

etwas bestim

in . gef

9 Zoll lang –

im Mus. of

Jarer

Pleuronectus flesus - Flunder. 3 Stück - mit
1. Würmer außen auf d. Darmkanal fest

Raja - Maid - foem. nichts

Anas albifrons 1 ms
+ 8. rothe Spiropteren zwischen den Magenhäut
- 2 Taenien in mehrere fragment aus d. Dünndarm
- 6 Distomen aus den Blinddärmen -

— Pleuronectes flesus - Flunder. 1 ms. nichts

Gadus - Whiting - 2
+ 6. Rundw. aus dem Darmkanal

Trigla cuculus - red Garnet - 1 -

13. - Pleuronectes solea - Sole -
——— . ihr etwas ähnlich
waren schon ausgeweidet.

14 - Larus marinus jung -
+ fragment von Taenien - Distomen und 2 monostom
aus dem Darmkanal -

13. Tetrao scoticus 1 f - nichts
— Columba oenas 2 ms nichts -
— Phas. colchicus - in d. Farb. des Weibl. fasc. doch mit
kürzerem Schwanz 18 Fed. - am Halse glänzend
schwarz wie Tet. tetrix - d. Tar. an d. Wurzel oben
etwas befiedert - soll ein Bastard seyn - würde
in . geschoß - d. Blinddärme waren jede 1 Sch.
9 Zoll lang - hatte keine Würmer
im Mus. of the zoological Society -

fr6.

14 Gadus aeglefinus Kadax – ff

+ 2 dike ~~d~~ kürzere Rundwürmer
10 lange Rundwürmer aus dem Darmkanal
1 — — aus den Ovarien –

+ – dann Scolex – und eine sonderbare Art kleiner Rundw. aus dem Darmkanal –

20 · Zeus –
+ mit kleinen Rundwürmern aus dem Darmkanal

20. Cyclopterus. Lumpus – 2 ms ~~mit~~ beyde mit wenigen
+ Scolex aus dem Schleim des Darmkanals, und den Anhängsel –
Pott. autumna Oehu nichts
Simia apella ff nicht – –

März
1. Numenius arquatus
+ mit sehr vielen langen Distomen aus d. Darmkanal
+ Num. – mit wenigen solch. Dist. aus d. Da

+ Scomber macrel – 1 mit
1 Rundwürmer aus d. Darmkanal

— Cyclopterus lumpus –
Scolex – Distomen – wenige Ascariden aus dem Darmkanal –

b. db fb. gb hb. kb. lb

mb nb

d. db fd gd. hd kd ld md

nd

f. bf df gf. hf k lf mf

nf.

g. bg dg hg kg lg mg

ng

h. bh dh kh gh lh mh

nh

k. bk dk gk hk. lk

mk. nk

l. bl. dl fl. hl. kl. ml. nl.

m. bm dm fm hm km lml mn

CODE
DE COMMERCE

Édition collationnée sur

L'ÉDITION OFFICIELLE;

AVEC

L'Exposé des Motifs de tous les Livres,
Et une Table des Matières par ordre alphabétique.

A PARIS,

Chez LÉOPOLD COLLIN, Libraire, rue Cit-le-Cœur, n°. 4.

1807.

V.

Vente des navires [de la]. Voyez *navires.*
— *des marchandises et meubles du failli.* Voyez *faillites.*
— *immeubles du failli* [du mode de la]; par qui et comment il y est procédé, 564. Tout créancier peut surenchérir; pendant quel temps, et à quel taux doit être la surenchère, 565.
Ventes [des]. Comment elles se constatent, 109.
Vérification des créances sur le failli [de la]. Quand et en présence de qui elle est faite, 501. Comment les créanciers sont appelés, pour quel délai, et déclaration qu'ils doivent faire, 502. La vérification est faite contradictoirement, et en présence du juge-commissaire, et dans quel délai, 503. Qui peut assister aux vérifications et fournir contredits, 504. Ce qu'énonce et contient le procès-verbal de vérification, 505. Représentation des registres des créanciers que peut demander le juge-commissaire, *ibid.* Formule pour admettre le créancier, 506. Quand et entre les mains de qui les créanciers affirment leurs créances sincères et véritables, 507. Ce que le juge-commissaire peut ordonner si la créance est contestée, 508. Ce que peut ordonner le tribunal de commerce, en cas qu'il lui soit référé par le juge-commissaire, 509. Procès-verbal qui est dressé par les syndics contre les créanciers qui n'ont pas comparu, effet de ce procès-verbal, 510. Nouveau délai qui peut être accordé par le tribunal pour vérification et notification du jugement qui l'accordera aux créanciers, 511 et 512. Da

114. Plumbeous. Falcon.

Length. thirteen inches and a ha
Plumage on th upper parts
lead colour: round the eye
some what bare — wings
and tail darkest: the last
six inches in length and
nearly blak, crossed near
the base and the middle
with two narrow lines of
white, but except the two
middle ones, only on the inner
webs, beneath white, transversely marked with narrow
ash coloured bars: chin
pale cinereous white:
just round the eyes bare
of feathers: between the
legs white: legs. long and
yellow — Inhabits cayenne

Manuscripte

von

Joh Natterer

Pedes carsorii Laufsfuß 3 nach
vorne keine hinten.
Pedes ~~natat~~ palmati Schwimmfuß
mit Schwimmhaut verbunden,
bey einigen die 3 vorne bey andern
alle 4 Zehen.
— semipalmati die hühnerartigen
Pedes lobati Lappenfüße eine Haut
an den Seiten der Seiten der
Zehen. wie Lappen
Pedes pectinati der Stand der
Zehen kammförmig gezähnelt.
Vögel können daher fliegen Gehen
Laufen Schwimmen

Sinne habe d. Vögel alle 5 Sinne
wie die Säugthiere mit einigen
Abweichungen. Augen lange
bey d. Vögel mehr nach Seitenwärts
2 Augenlände eine Nickhaut
dem Schwarzen Fächer in der Iris
~~[illegible]~~ zur Mäßig. der Lichtstrahlen
Gesicht ist sehr scharf besonders
bey den Raubvögeln.
Gehör eben so gut keine
Ohrmuschel die Ohröffnung
mit Federn bedeckt oder nicht

eilin Gehörknochen sehr einfach
Geschmack scheint der schwächste Sinn
zu sein weil die Zunge meist
kartilaginös ist.
Betastungsvermögen scheinfehlt meist
bey den Enten &c scheint es
am Schnabel zu sitzen.
Vögel haben keinen Kehldeckel haben
eine doppelt Kehlkopf
Die Luftröhre ist ein langer
knorplicher zylindrischer meist
gleichweite Kanal nach an
der Länge zertheilt er sich in
2 Theile die Zirkelringe sind
sehr verschieden breit schmal abstehend
knorplich sie ist entweder
durch aus gleichweit oder 1-2
Mahl sehr erweitert. bey den
Wasservögel haben an der Zertheilung
unten ein 2ten Kehlkopf der
entweder häutig, oder knorplich
ist. die Länge ist meist jene
des Halses bey einigen um.
die Hälfte oder um ein
Ganzes länger muß daher
eine oder 2 oder 3 Krümmungen

machen bey einigen geschieht diese
Krümmung in einer eigenen Höhle
des Brustbeins oder Ausserhalb
Ihr Gesang ist nicht Nachahmung sond
ist angebohren. Vögel die die
Zunge kurz breit fleischig haben
können die Stimme der Menschen
nachmachen.
Nahrung besteht theils in Pflanzen.
Saamen Insekten andern Vögeln
oder Thieren. dazu ist der Schnabel
eingerichtet
Diesich von Saamen nährende haben
meistens einen Kropf auch viele
Raubvögel die Raubvögel erbrechen
die unverdauten Stoff wieder
von sich. Die meisten Vögel
schlafen des Nachts
das Wandern von rauhwärmern
Gegenden im Herbste, oder das
Ziehen
Begattung geschieht meistens im Frühjahre
die meist. leben in Monogamie

der Hoden liegen unter der Leber am Rückgrade
Eyer sind gelbe Körper die mit einem Nielchen am Eyerstocke befestigt ist.
das Bestrichtete Weibchen wird durch den Instinkt angetrieben sich ein Nest zu bauen. Das Brüten ist meistens das Geschäft des Weibchen

adunca hornotina
Gesner Aldrovand Jonston Frisch Seligman
Buffon Brisson Eduards Albin. Rayus
Sistema Linnaei Latham Bechstein Leske
Cuvier.

Die Vögel werden ins Abtheilungen gebracht
1 Ord Accipitres kurze sehr stark füße starke Krallen pedes ambul. vel gressorii Schnabel ist Hakenförmung gebog rost. aduncum
2 Ord Passeres Stangvögel pedes amb. vel gressorii etwas höhere schwächere Beine Schnabel ohne Haken
3 Ord Scansores Klettervögel kletter füße pedes scansorii
4 Ord Gallinae pedes semipalmatos
5 Ord Grallae Sumpfvögel sehr verlängerte Tarsen unbefiedert gewöhnlich pedes gressorii vel cursorii

6 Ord Anseres Zwimmvögel pedes palmati vel lobati.

Amphibia serpentaria.
Wahres Skelet kein Brustbein eine Hyzohr Lungen sind lang Athmen geschieht wie bey den Eydechsen. Sehr langen Körper ohne Flüße mit Schuppen bedeckt keine äußere Gehöröffnung, Bewegung geschieht durch wellenförmige Krümmung des Körpers, durch ihre Zuppen und Schildern dienen ihnen durch zur Stütze auf der Grase oder rauhen Boden unter die sich damit festhalten und fortschieben Kopf ist verhältnißmäßig kleiner ist oval oder gleich plattgedrückt zunge ist schmal gespalten liegt in einer Scheide die Kinladen sind nur durch Bänder mit einander verbunden deßwegen lassen sie sich sehr stark dehnen und können daher sehr groß Thiere verschlingen
einige haben Giftzähne in der obern Kinlade sie sind hohl in einer zelligen Scheide eingeschlossen lassen sich hervorstecken

gewöhnlich sind sie 2-3-4, sind lange
gekrümmt hohl andar Oasis ist eine Blase
worin das Gift ist beym biß wird
die Blase gedrückt das Gift fließt
durch in den Zahn dan in die Wunde.
das Gift wirkt gewiß auf das G. Nerven-
system und nicht durch coagulation
des Blüts
~~Innerliche Mittel~~ die Eupatoria wird in
Ostindien
Giftige Schlangen haben mehr plattgedrückt
herzförmigen Kopf kleinere Schuppen
auf den Kopf, die Masse ist meist
aufgebrochen Schuppen erhaben Schweif
kurz rauhe zugespitzt sind nicht
furchtsam setzen sich zur Wehre.
die meisten Schlang leben auf den trocknen
in Wälder auch in Sümpfen und
Wassern
Weibchen legt viele an einander gekettete
oder einzelne Eyer einige gebähren
lebendige Jungen

1 Gatt. Aequis Schuppenschlangen ganzen
Körper mit Schuppen bedeckt.
kleinen Kopf stumpf. Schw. keine Giftzähne
— fragilis wegen ihr gebrechlichkeit
Blindschleich.
— Coluber Natter Schilder auf den
Bauche Schuppen unter dem Schwanze
— naja Brillenschlange die Zeichnung
einer Brille auf der Halse.
Coromandel. Biß tödt
— viperus Ceberbebraun schwarzes
Band überm Rücken
— illyricus Bräunliche wellenförmiges
Band überm Rücke Masse aufgeworfen
3-4 Fuß Istrien sehr gefährliche Biß
— brester stahlblaue Farbe Biß nicht
sehr giftig in Gebirgen.
— redii Italien Ceberbrau 4fache
Reihe von Flecken
— romanus vel Aesculapii 4-5-6 Fuß
in Italien Spanien sind sie sehr groß
sie ist auch in Oestreich keine Giftzähne
— natrix Haisnatt 2 Flecke an dem
Kopfe. unschädlich
— austriacus Oestreich Vis feld
unschädlich.

Boa Silberschlang
Schildern auf den Bauche als auf der
untern Seite des Schwanzes
— constrictor 30–50 f. 3–4 f. im Diameter
Ostindien keine Giftzähne.
— Crotalus Klapperer
Schilder auf den Bauche Schilder und
Schuppen auf der unt. Seite des Schwanzes
haben eine Klappe an dem Ende des Sch.
sind in Amerik selten 6–7 Fuß
lang das heftigste Gift
crepitaculum caudae besteht aus 3–4
und bis an 30 Gliedern man glaubt
daß sie alle Jahr ein neues Glied
bekömmt.
— horridus.
— Hylus Wasserschlang.
gegen das Ende plattgedrückter Schwanz
schuppiger Körper

monst. per excessum

Diese Bastarde sind meistens un-
fruchtbar
Instinkt entfernter Aufenthalt
Verschiedene Gattungszeit periodische
Entwicklung der Geschlechtsorgane
Lebensart der Thiere Kunsttriebe Verhindern
im Fregen Zustand die Bastardirung
& Verschiedenheit der Zeugungsstoffe

Ernährung geschieht ~~bei~~ auf 2fache
Art. Pflanzen nehmen ihren Nahr-
ungsstoff durch die Wurzeln
zu sich.
Die Thiere nehmen ihre sehr zu-
sammengesetzte Nahrung durch
ihren Mund zu sich, ~~letztere~~
brauche aber sehr große
Aufwand von Organen um
diese sehr zusammengesetzte
Substanzen ihren eigenen
Fermente homogen machen
sie müssen verkleinert werden
mit Säften die auf selbe Chemisch

wirkt vermischt werden
um einer beträchtlichen Zeit
ausgesetzt werden damit der
Verdauungsprocess vor sich gehen kann
die abgeschiedenen brauchbaren
Stoffe werden als wahre Fermente
und auch unzählige Gefäße dem Blute
zugeführt, um die abgenützten Theile
zu ergänzen dadurch wird
die Erhaltung des organ. Ge-
erzweckt dieß ist d. 1 Gr der
Ernähr.
Wegen größerer thätig. der Organe
wird der Erzeugung mehrer
Wachsthum ist der 2 G. der Ern
und ist Vermehrung der schon
bestehenden Materie

Diese Gränze der Dauer des
Wachsthum sind Abwechsel unterworfen

Welt bringen heißt eyerlegende ovipara
Kam giebtes Thiere die ferner ihre
Jungen außerhalbs des Eyers zur
Welt bringen aber noch ganz unvoll
kommen.

Thiere insbesondere.
Animalia
Zoologie heißt die Lehre dieser Thiere
Thiere sind beseelte organisirte Kö.
die ihre einfache Nahrung durch
willkürliche Bewegung aufsuchen und
selbe durch eine einfache Oeffnung
zu sich nehmen.
Die Art wie die Thiere ihre Nahrung
zu sich nehmen die willkührlichen
Bewegungen der Thiere; der hohen
Grad von Empfindung Sensibilität
charakterisiren die Thiere
hinlänglich von Pflanzen
zuletzt ist es die Chemie die
es ist keine Pflanze die ihre Nahrung
durch einen einfachen Wege
ihre Nahrung zu sich nimmt
Die Thiere nehmen sehr mannig-
faltige Nahrung und meistens
organisirte Körper, werden
durch ein besonderes Gefühl an-
getrieben ihre Nahrung zu suchen

diese Art sich zu ernähren setzt eine willkührliche Bewegung voraus weil sie ihre Nahrung suchen müssen

Diese willkührliche zweckmäßige Bewegung ist ausschließlich den Thieren eigen. in der Empfindung, im eigentlichst. Sinne

~~Da die Bild. der Thiere sehr mannichfaltig sind, so herrscht doch eine große Übereinstimmung in den~~

Jeder thierische Körper besteht aus festen und flüssigen Theilen er besteht aus Wasser Eyweißstoff gallerte Zuckerstoff d

diese weiter zerlegt ~~Wasserstoff~~ Wasserstoff Sauerstoff Kohlen. Stickstoff Kalkerd Eisen, aus diese Urstoffen

Das Blut ist die Auflösung des Milch und Nahrungsstoffs

Alle Thiere haben allgemein Gefühl eine besonders den Sinn des Geschmack in der Wahl ~~der~~ ihre Nahrungsstoffe bey manchen Thiere zeichnet sich manchen ein Sinn besonders aus, ~~d~~ Geruch Gehör Gesicht bey Würmen fehlt sehr oft, das Betastungsvermögen fehlt den meisten beynahe allen. bey den Menschen ist es im sehr hohen Grade an den Fingerspitzen. die Enten haben es am Schnabel.

Alle rothblüthigen haben alle 5 S wie der Mensch, obgleich in verschiedener Vollkommenheit

bey keine Thiere sind alle 5 Sinne so gleich vollkom als beym Menschen

Der Mensch hat allen Seelenkräfte oder fähigk
Vorstellungskraft Gedächtniß Aufmerksamkeit
Instinkt ist jener Drang der Thiere wo
durch sie so zu sagen angetrieben wirksam
Bedürfniß zu verrichten
Bey der Mensch wird nur ~~vor~~ als Kind
durch Instinkte geleitet

Bey allen Thieren bemerkt man nicht allzu
widerte Kennzeichen des Schlafes einige
Thiere schlafen mit offen Aug, sie
genießen aber alle eine gewisse
Ruhe. Die meist Th. schlaf bey
Nachts nach ihren Bedürfnissen
die aber des Nachts ihrer Nahrung
nachgehen schlafen bey Tag.
Außer dieser Erhaltungsschlaf genießen
~~noch~~ andere einen periodische Ruhe
in der Jahrszeit wo sie Mangel
an Nahrung hätten, dieß heißt
der Winterschlaf.

Während dieser Ruhe ruhen alle
Organe, Zirkulation geht äußerst
langsam Respiration fast gar
nicht werden starr kalt das Blut
beynahe weiß. Asphixie
Die meisten Thiere werden durch den theilsnormalen
physischen Reiz zur Fortpflanzung
genöthigt bey den meisten wirkt
sich der Geschlechtstrieb periodisch
die im strengen Naturzustande
sind wenige Thier sind ganz geschlechts-
los.

Grand
Tou. an a gorge ventre rouge
flügl. 7 1/4 Zoll Par M.
Schnabl. 3 3/4 Zoll
Schwanz an d. roth Bugelfeder 4. 5 Li
folgende
Gegenstände ~~[illegible]~~ zum
Gebrauche des K. naturalien Kabinets
und zu ~~Theils als~~ Mustern für den Nieder
Gewerbs Verein. bestimmt sind.

Das Thierreich zerfällt in 2 Hauptabth.
2 Abth. 1 Thiere mit Wirbel und mit roth
Blut 2 Thiere ohne Wirbelsäul und mit
weißen Säfte statt des Blutes.

Ihr der 1 Abthlhabe Knochen, die ein
inneres wahres artikul. Skelet bilden
Unser Skelet dient einer Wirbelsäul
zur Stütz dient auch den Nervensystem
zur Hülle das vordere End trägt
den Kopf, das hintere endet sich
meistens in einer Schwanz os coccidis
An beyden Seit befinden sich nicht
Rippe costae, das ganze Skelet hat
gewöhnlich 4 Extra mehre 2 und
andere gar keine Extra.
Der Kreislauf geschieht durch ein
muskulöses Herz welch entw
doppelt od. einfach ist
Das Gehirn liegt in Höhle im Kopfe
Alle halen 5 Sinne
Der Mund besteht aus 2 Kinnl
öffnet sich von oben nach Unten

Klein Litt
Schuhe
S. Philips
S. ouvidor *
S. Hesqueth =
Schraam – Schaaf – Scharf –

Saamen –

6 vint

Anta –
6. vint – ao França
Sapatos –
Espingarde
Amerikaans. Zeit

nin





Brad 36 sp

640 –
30
19.206

300

320
30
9600

600
400
200
10.000

320

120 –
320

160
32
320
48
5126

6.

120
40
4800

1829.

Varia

Bos taurus ferus.

Von den Augenhöhlen bis zum After gerade gemessen 7 Sch. 7 Z.

Von der Nase über dem Rücken ~~mit~~ alle Bügungen gemessen bis zum After 9 Schuh 3 Zoll

Von Schuhe des Vorderfußes bis Mitte Rückens 5 Schuh 9 Zoll

——— des Hinterfußes bis ——— 5 Sch: 3 Zoll *

Höhe des Vorderfuß bis zur Brust 2 Schuh 5 Zoll

Von Rücken bis zur Brusthaut vor den Vorderfüßen 3 Schuh 2 Zoll

Von Rücken bis zur Bauchnath 3 Sch. 6 Zoll

1 Schuh beiläufig hinter den Vorderfüßen gemessen

d 9. Juny 1809.

Felis tigris femina.

Vom After bis zu den Ohren 4 Schuh 5 Zoll

Von Mitte Rücken bis zum Ballen des Vorderfußes 2 Schuh 9 Zoll

——— Ditto ——— des Hinterfußes 2 Schuh 6 Zoll.

* die Schnur war etwas über den Schenkelknochen gebogen



Schwanz keine Bakentaschen behaartes
Gesäß, die Öffnungen der
Nase sind seitwärts einige
haben Voll- andere schlaffe
Schwänze mit Vollschwänzen

1 Calli: capucina Winselaffe
Sudamerica

2 Call. trepida Buschschwanzaffe

3 — fatuellus Hornaffe
mit schlaffen Schwänzen

Call midas ~~Madaga~~
— jacchus sagouin

Cercopithecus uneigentliche Meerkatze.
Kopf zusammengedrückt, Kinnladen her-
vorragend Gesichtswinkel zwischen
50 und 60 gr. langen Schwanz
Bakentaschen nacktes Gesäß
sind in Afrika zu Hause

Cercopithecus mona
— diana
— Sabaeus grüner Affe
Senegal und Madeira

4 G. Cynocephalus Hundskopfaffe
zusammengedrückten Kopf Gesichtswinkel
45 grad nacktes Gesäß Baken-
taschen, Schwanz bald kurz bald lang
nach den Schwänzen kann man
sie in 2 verlegt Ordnungen

— cynomolgos

5 Gattung Papio Pavian Baboon
Schwanz stehlt
Kinnladen bilden eine Schnauze
Gesichtswinkel 30 Grade
Bakentaschen nacktes Gesäß
Papio mormon vel maimon Guinea

Cebus Häulaffe.
konischer Kopf keine Baken-
taschen bedecktes Gesäß
Vollschwänze beinerne
Trommel in der untern
Kinnlade

zugespitztes Gesicht die Zähne
in der untern Kinnlade rügen
schief hervor

Tarseus. Vorderzähne ungleich
die ~~hinten~~ Tarsen der hintern
Extremitäten ~~sind~~ sehr
verlängert.

2 Familie Makiartige Thiere
~~die~~ 6 Vord: z. in d. untern Kinnlade
4 in der obern spitzige
Schnauze
1 G Lemur Maki
Lemur mongoz
catta
macaco vari
2 Gattung Loris
2 Arten abgestumpftes
Gesicht etwas aufgeworfene
Nase keinen Schwanz
4 Brustzizen.

3 Gatt. Garago
die Tarsen sind sehr
verlängert sehr große
augen kahle Ohren
langen haarigen Schwanz
2 Ordnung
Flügelfüßer Tiropodes
die Extremitäten sind mit einer
Haut die den ganzen Körper
umgiebt verbunden.
30 Arten
5 Gattungen
Das Gebiß ist sehr verschieden bey
den Fledermäusen.
1 G Afterfledermäuse Galliopithecus
fliegende Maki. chat volant
2 Vorderz in der obern Kinnl. auseinander stehend
6 Vor.. in der untern Kinnlade
Zehen von gleicher Länge, behaarte
Flughaut.
1 Gr Teroceus
Vampyr Blutsauger
4 Vorder. welche Schneidezähne sind
in jeder Kinnlade

kleine Ohren, keinen Schwanz, stachlichte Zunge.
Teroceus pampyrus 5 – 6 Fuß
missen die ausgespannten Flügel
3 Gatt Vespertilio
2 – 4 Vord: in der obern Kiml
langen Schwanz
— murinus
— auritus
— — pipistrellus Zwergfledermaus
4 Rynolphus
2 Vordzä
4 — in der untern
ein häutiges Blatt auf der Nase
— ferrum equinum Hufeisen nase
5. Phylostomma
2 – 4 Vordz: in der ob: od in beyden Kinn Blatt mehr an der Spitze der Nase gegen den Mund zu kurzen oder gar keinen Schwanz.
— spectrum trichterförmigen Ansatz an der Nase in Südamerika

er saugt den Thieren das Blut aus auf den Fußzehen.
6 Noctilio
2 – 4 Vordzä in beyden Kimlad einfache Nase.

Raubthier Ferae

keinen abgesonderten Daumen an keiner Extremität. Gebiß besteht aus 6 Vorderzähnen in jeden Kimlade Eckzähne einzeln lang spitzig auch 6 Vo. in der obern 8 in der untern Backenzähne von 3 bis 6. an der Zahl entweder mehr spitzige Kronen oder 3 spitzig Einige treten auf der ganzen Fersen auf andere auf der Spitze der Zehen
1 fabuli Plantigradii Fersentretten
Digitogradi Zehentretten
1 Familie sind einsame Thiere im Winter bringen sie in Erstarrung

1 Ch. Erinaceus Igel.

6 Vorderzähne in jeder Kinnlade die mittleren Vord: sind sehr lang die äußern sind viel kleiner sein Körper mit Stacheln besetzt corpus spinosum Mund bildet eine Schnauze oder Rüssel

1 Art — europeus aufgeworfene Nasenlöcher

2

6 Vord. gleiche die Schnauze ist spitziger Schwanz fehlt halbstacheligen Körper.

Sorex Spitzmaus

6 ungleiche Vorderzähne in beyden Kinnladen die mittler untern Vor. sind sehr lang schief hervorgestreckt, langen spitzigen Rüssel, sie sind fleischfressende Thier

1 Art. Sorex araneus

— fodiens Wasserspitzmaus

Bibermaus

6–8 ungleiche Vorderzähne der 2. Vord: in jeder Kinnlad ist länger als die mittleren Schwimmfüße

moschatus Bisamratte

sie lebt zwischen dem Wolga und Don und heißt Tuchowol in unterirdischen Höhlen

— Wassermaulwurf

Vorderfüße Grabfüße hinteren Schwimmfüß

Chrysochloris Goldmaulwurf

Vorderfüße dreyzehig hinteren 4zehig ohne Schwanz

— capensis

Talpa Maulwurf

Vorderzähne sind gleich 6 in der obern 8 in der untern Kinnladen 5 zehige Grabfüße

— europaea gemeiner Maulwurf

8 G. Ursus Bär

6 gleiche Vorderzähne in jeder Kinnlade sehr lange Ekzähne Mahlzähne sind von den Ekz. getrennt durch einen leeren Zwischenraum. kurzen Schwanz.

— ursus arctos Landbär

— — glacialis maritimus Eisbär weiß an den Küst von Nordeuropa Island Nova zembla Stirne ist viel platter als beym Landbär Füße sind höher

9 G. Taxus Dachs

Mahlzähne läuft ununterbrochen mit den Ekzähnen fort kurze Füße längeren Schwanz.

— — meles gemeiner Dachs

— — — capensis — nährt von Honig

— — — gulo Vielfraß Sibirien

— lotor Waschbär längeren Schwanz kürzeren Schnauze.

Nord amerika

Nasua Rüsselthier

nasua rufa

— fusca.

12 ~~Ich~~ Potos Potos

Vollschwanz kurzen Rüssel

— —

13 Ichneumon

6 Vor: gleich in jeder Kinnlade. langer zugespitzter Schwanz kurzer gespitzter Rüssel

— — vulgaris zugespitzter Schwanz ~~an~~ in Afrika an Ufern des Nils lebt von kleinen Thieren und Eyern ~~d~~ besonders der Krokodile

2 Familie Zehentretter.

Gebiß ist wie beym vorig

6 Vi. in jeder Kinnlade

3 bis 5 Mahlzähne spitzige Ekz.

1 G. Mustela Marder.
langen Körper kurze Füße
kleinen Köpfe.

— — zibellina Zobelmarder
— martes Baummarder
Kehle gelblich.
— foina Hausmarder
Kehle weiß.
— putorius
— sarmatica Jägermarder
Pohlen
— erminea Hermelin
schwarze Schwanzspitze im Winter
wird es weiß.
— vulgaris gemeines Wiesel.
— Lutra Otter.
plattgedrückten Kopf Schwimmfüße
pedes palmati,
— — — fluviatilis v vulgaris Flußfischotter
— marina Meerotter zwischen
den Küsten von Amerika und
Asien das Fell ist besonders
schön: dunkel schwarzbraun

Mephitis Stinkthier
Körper — Zehen haben lange
Grabkrallen Sack mit stinkender Substanz
sind in Amerika zu Haus

Viverra
verlängerte Schnauze einen
Sack zwischen den Geschlechtstheilen
mit riechender Substanz
mehr ein hundartiges Gebiß
— zibetha
— genetta. Levante Schainen

5 G. Felis
stumpfes Gesicht wenig ver-
längerte Schnauze zurückziehbare
Zehen rauhe Zunge linguam
asperam 5 G. und der vord. 4 und
5 der hintern Extremitäten
6 Vord. in Ob und untern
3 höchstens 4 spitzige Mahlzähne
14 Arten
Felis Leo Löwen. caudam flocosam
— tigris in Asien bloßmeiste
Bengalen an großen Flüssen

— parduo od. panthera nicht so
langen Schwanz. rundliche Flecken
Afrika
— leopardus noch kürzern Schwanz
2 u. 3. 4 Flecken stehen in einem
Kreis zusammen bloß Afrika
— pardalis Ozelot braunliche
Farbe oben mehr gestreift
als geflekt. in Westindien
lauern auf Bäumen auf Menschen
oder Thiere und stürzen sich
auf ihnen auf das Genick.
— lynx Luchs in allen Welttheilen
— catus (ferus) Wildkatze Rücken
langgestreift Seiten spiralförmig
gestreift. Europa und Asien in
Wälden Stammrace von den
zahmen Hauskatzen.
— — domesticus
— — hispanicus weiß schwarz
und gelb.
— — coeruleus Rap.
— — angorensis lange Haare

S. N. C

Ill.mo Snr. José Com

Ouvidor pela Lei nista

&c &

Do Juiz ordr. da N.a d

Kiste 9. VII Transport.

Glas. n° 1. A

Lacert. n° 120. 1 f. Rio Araguay Nov. 23. dem n° 76 ähnl. doch mit viel läng: Hinterfuß und 1 Junges.

Lac. n° 103. 1 ms Rio dos Pilpens 27 Sep 23. ähnlich der Lac. n° 90.

Bufo n° 113. 2 Ex. Sappo 4 olhos.

Hyla n° 114. 1 f. Cuyab

Lac. n° 77. ? 1 ß Yp.

Rana n° 82. 3 Ex. Colub n° 70. 1 f.

2 verlag Art Monoculi die auf d. Kiemen des S. auratus sich

Ein Scorpion aus d. Sertão v. Cuyaba

Eine junge Hoypera n° 65.

Ein eben aus d. Ey gebrochener Stellio n° 10.

n° 2. B

Salmo 1 Stück Lambari von Cuyaba

Silurus n° 25. 2 Ex. Trisanga 23.

Amphisbaena n° 119. Cuyab

2 groß Schnee von Cuyaba

Molossus gymnonotus Nat. Cuy

n° 3. C

Phyllost n° 98. 2 groß Embryonen

Molass. n° 94. 1 sehr kl. Embrio

Didelph domestica ~~[illegible]~~ 3 Jung.

Bufo n° 121, 1 Ex. 22.

3 Oestrus Larven aus Did. Philander

Salmo Pequira 17 Exempl.

//.

No 4. D

Ityla nro 122 – cyab.

Salmo pectoralis – 3 fr

Salmo Sauà 4 f.

Didelph domestica 1 fungos

Illmo. Sr. Dor. Natural

Pogo a V. Sa. me fazer o favor Caso te-
nha de me a Remediar com hum
Bucado de Espirito de Victriolo e
hum Bucado de Resina de Jalapa
o por Dro. D do Forma q. V. Sa. me
determinar de cuio favor espero
em V. Sa.

Affo. e Obrigo.

Conce.

Rio Xié — 1 f.
2 ms —

Riçanna 1 m.
1 ms jung
1 f. alt.
1 f. alt.

Rio Vaupé

Macaw. barrig —
Xié — ~~1 ms~~ 4 Jung. 831
— X jung —

Vaupé
barrig 1 f — 7 July 831
Denicul. 1 m 1 f — 7 July 831
barr. 4 1 ms 3 f —
barr. 1 f — ~~22~~ July. 10 =
— 1 f. ~~23~~ July
cutia de vr 1 jung — 23 —

Eurystomus gularis (Vieill.)

Eurystomus gularis – Vigors

Green throated Eurystomus.

Jard & Selby. Ill. Orn. v. III

plate 109.

E. rostro flavo, capite cæruleo-viridi, corpore supra cinnamomeo-rufo subtus cinnamomeo purpureo, gulo lacte azureo, remigibus lazuleis apicibus nigris, cauda subfurcata duobis rectricibus interneis nigris, reliquis ad basin azureis apicibus nigro lazuleis.

Eur. gularis Vig. MS. J. Zool Jour

j.

Length 9 inches—

Habitat. ?

Zoolog: Society's collection.

Bergkrystall hat auch selten andere
Fossilen eingeschlossen Asbest Chlorit
Strahlstein. Wasserstrahlen

1. Abart Rauchtopas Rauchkrystall
farben rauchgrau.

2 Moriont. Schwarz. Bergkrystall.
3 Cytrin. weingelb Topasquarz.
4 Vor Amethyst violblau. meist in
Clausen angehäuft. in Urgeb.
5. Rothen Quarz durch Eisenoxyd gefärbt
Hyacinthquarz. von Compostella.

2 Art Quarz. vulgare.
mehr oder wenig durchschnd. meist ungefärbt
aber auch krystallisirt.
1 Variete. Rosenquarz durch Braunstein
gefärbt.
2.
3 Grüne Quarz blaugrün. derb oder
krystallisirt.
4. den Saphirquarz. blau.
5 Opalisirender Quarz.
6. Fettquarz fettes Ansehen.
7 Linsenförmig.
den geschlossenen Quartz
9 Zeltenquarz
10 Stänglichter Quarz.

11 körnigt im Bruche.

Gelenkquarz. in Brasilien

2 Gtt. Feldspath.

1 Art gemeiner Feldspath

in Urgebürgen als Bestandtheil in Granit.

1 Art blauer Feldspath. Weyhmerk.

2 Abr. Amazonenstein grüner Feldspath

Sibirien

2 Art Adular. opalisirender Feldspath

ess. in der Schweiz Tyrol Böhmen

3. Labrador Feldspath

5 Art Katzenaugen, T.

Glasstein

Aquinit Petrospathum vitreum

Diamanthspat

Harzstein. Schöml. Scorlus.

Scorlites Stangenstein

Turmalin.

Granat in Dodecaedren 12 Seit.

Böhmer Mähren.

var. grüner Granat in Sibirien

2 Art Chelanit schwarz von Farbe

10 Gtt Scapolit

Diamant Adamas.

er übertrifft an Härte alle Possilien im Mineralreich. er trotzt allen Versuchen der Chemiquer. er ist dem reinsten Kohlenstoff. schwerer 3400 kalt anzufühlen in eckigen oder runden Körnern doppelte 4seitige Pyramide ist von allen Farben

Golconda Mallacca Visiapour Brasilien

30 Grad nach Wedgewood verschwindet er.

Saphir Telesin, Sapphirus. gewöhnlich blau wasserhell.

4000. gewicht unschmelzbar.

Kristalls. 6seitig. einfach. Pyram.

Kalkerd. und Eisenox. und reine Tonerde 98 pro.

Ceylon Persien Sib. Brasil Böhm

Rubin Spinell. farb. roth. alle Farben

er ritzt den Quarz wird vom Saphir geritzt. Gewicht 3000 die Chromsäure

Asien Ceylon.

Chrysolit pistacien grün oliven grasgrün

Cephalis 4seitige Säule. 3375 Gew.

die Talkerde Kieselerd Eisenox. Zeylon

Chrysoberyll (Cinophame) weingelb

mehr oder weniger opalisirend ritzt den Quarz gen 3700. in Körnern

Tonerde Brasilien Zeylon.

Topas. Topasus. zwhnlich gelb. ~~war~~ auch wasserklr.
Kristlls.
Smaragdus.
Beryll Siberien
Zircon
Hyacinth orangegelb hyazinthroth.
Edle Granat böhmischer Gran. er ritzt den Quarz
Leucit Amphigene. weißer Granat
24 seit
Euclase.
Olivin basaltischer Chrysolit
Augit. Piroxène.
Prenit
Chalcedon
Carneol.
Grüner Calcedon.
Agath

Vulcanische Producte

1 Puzzolanerde Tras.
2 Lava von verschiedener Härte.
3 Bimsstein.
Gebürgsarten Saxae.

3 Rasse
1 Kl. solche Fessle wo die Gemengthle ohne alles Bindungsmittel ~~an~~ verbunden sind
2 Kl. wo die Bestandtheile in einem Teige so zu sagen eingebettet sind.
3 Kl. wenn zusammengehäufte Körner oder runde Fossilien ~~in~~ an einander so zu sagen gebettet sind
1 Klss 1 Gtt.
Granit. Gemengtheile Quarz Feldspath und Glimmer.
1 Art. ächter Granit hat diese 3 Gemengthle
2 Ar Halbgranit wenn eins dieser Gemengthle fehlt.
3 Ar der übermengte Granit der außerdem 3 Bestandthl noch ~~eine~~ andere Arten eingemengt hat pl. Granat Schörle Hornblende Strahlstein.
2 G. Gneus. Gneusum.
Quarz Feldspath glimmer nur sind sie nicht mehr fountereinander gemengt und mehr blättrig schiefrig.

3 Glimmerschiefer. Quarz Glimmer übermengter, mit Granat &c. Murchlin

2 Klasse
1 Gatte. Porphyr. oder Feldspath oder Quarz sind in einer gleichförmigen Masse eingewachsen.
ächter.

Puddingstein Breccia.
Halb- Kiesel - Thonbreccien.
2 Gtt. Sandstein.
komt in aufgeschwemmter Gebrg. vor.
3. Klsse. Brennliche Fossilien nicht mettalische Körper.
Inflammabilia.
1 Ord. Schwefelige.
1 Gtt. Schwefel Sulphur
1 Art Natürlicher Schwefel - nativum.
2 - Vulcanisch
2. Erdharze.
1 1 Gtt. Bergöhl
1 Art Naphta.

Gtt Lithanthrax.
1 Art Gagatkohle.
2 Art Pechkohle. 3 Art. Glanzkohle. 4 Art Schiefer 5 Stangenkohle. Grobkohle
Gtt. Braunkohle. 1 Art Bituminöses Holz. Moorkohle.
4 Gtt. Bernstein

4 Klss Metalla.

Farben sind Abänderung vom weiß und gelb.

es gibt noch

Columbium Tantal Silerum

Rhodium Iridium. Osmium



L. Bonap. Amer. Ornith.

Tetrao urophasianus

III. t. 21. f. 1. fem.

Cock of the Plains, Lew. & Clark.

Missouri, Rocky Mountains.

L. Bonap. Amer. Ornith.

Tetrao phasianellus III. t. 19.

Lin. Gm. Lath. Briss. Tem. Vieill.

Tetrao urogallus var. β. Lin.

Gelinotte à longue queue Buf.

Francolin " " " Hearne

Tetras phasianelle, Tem.

Long-tailed Grous, Edw. Lath.

Sharp-tailed Grous Penn. L. Bonap.

Grous, Prairie Hen, Lewis & Clark.

Virginia, Nord Amer.

Al. Wils. Amer. Ornith.

Tetrao umbellus
VI. pl. 49.

Ruffed heathcock, or Grous, Edw.

Gelinotte huppée de Pennsylvanie
Briss.

Al. Wils. Amer. Ornith.

Tetrao cupido. III. pl. 27. f. 1.

Gelinote huppée d'Amerique Briss.

Urogallus minor, plumis alijformibus
Donatæ, Cat.

Tetrao lagopus? Bartr.

Heath-hen, Barren-hen

Pinnated Grous

Nord-Amer.

Al. Wils. Amer. Ornith.

Perdix virginianus. VI. pl. 47. f 2.

Virginian Quail
Maryland " Turt.
Perdrix d'Amerique Briss.

L. Bonap. Amer. Ornith.

Tetrao canadensis, III. t. 20. mas.
t. 21. f. 2. fem.
Lin. Gm. Lath. Tem. Vieill.
Tetrao canace, Lin.
Lagopus Bonasa hudson: Briss.
" " canadensis Briss
" freti Hudsonis, Klein
Gelinotte du Canada, Buf.
Tetras tacheté, ou Acaho, Tem.
Black & Spotted Heathcock, Edw. mas
Brown & " " Edw. fem.
Spotted grous Penn. Lath. L. Bon.
The small speckled Pheasant, Lew. & C.
" " brown " Lew. & Clark.

Hudsons Bay
Canada, New Scotland

L. Bonap. Amer. Ornith.

Tetrao obscurus III. t. 18. fem.

Say

Roxy Mountains.

6. Gecco.
warzigen Körper zehen lappig
mehr od. w. nagelloß.
— teres Ind. Arab. Italien
giftig Schauer Gebiß giftig
7. Scynthus. Bauch keine
Schilder sondern Schuppen
— officinalis Arabien Aegypten
8 G. Amerina
einfach. schuppigten Körper
— agris
— viridis gebirgichten Gegend
2 fü
Sauri bipedes entwed. bloß
1/2 Pord. od. 2 Schirt
3 f. — apodes

in der obern Kinlade sind
die Giftzähne nach hinter gebogen
1–3–4 sitzen an jeder Seite der
obern Kinlade, die eigentlichen
Giftzähne sind lang hohl spitzig
an der Basis sind sie mit einer
häutigen Blase verbunden
worin das Gift sich befindet
im Sommer ist der Biß weit
gefährlicher als im Winter

nicht innerlich genommen ist dieses
Gift schädlich.
unter sich ist ihnen ihr Gift
nicht tödtlich.
1 Kopf ziemlich groß. ~~Haken~~
breit mit kleinen Schuppen bedeckt
Nase aufgeworfen oder der
Rand erhaben, Schuppen sind
kielförmig. Schweiß kurz
gähe zugespitzt
sie sind nicht so furchtsam als
die nicht giftigen
Meisten Schlang. leben auf
trockenen Lande, einige
in Wasser im Winter
in kältern Ländern sind sie
erstarrt
Russel account
1. Anguis Schuppenschlang Blindschleich
auf den ganzen Körper Schuppen
— fragilis gemeiner. unschädlich
— pena.
2. G. Coluber Natter
Schilder auf den Bauch Schuppen
unter den Schwanze

— naja. Brillenschlange sehr giftig
3–5 f. Ostindien
— viperus Viper lebenbrau
schwarzes Band übern Rücken
— illyricus sehr giftig
aufgeworfene Nase Illyrien
— englische Natter
schwarz Schneeb. England
— redii Istrien viele
Reihen von schwarzen Flecken
— romanus romanische 4–5 Fuß
— natrix Hausnatter 3–4 f
— austriaca
Boa Schilderschlang
Schilder auf den Bauch und unter
dem Schwanze
— constrictor 30–50 f lang 3–4 f dick
Abgottsschlange Ostind Afrika
keine Giftzähne
Crotalus Klapperer
Schilder auf den Bauch Schilder

und Schuppen unter den Schwanz
er endet sich in eine Klapper
sehr starkes Gift. Klapper
besteht aus 6–30 halbdurchsichtigen
hohlen Gliedern.

4 Ord. ramina froschartige
patrachi Thiere
keine wahren Rippen, kein
vollkommenes Sternum einfaches
Herz große Lungen
keine wahre Begattung
legen blasen ähnliche Eyer
haben eine glatte fleimigte
Haut drüsigt haben 4 Fuß
1 familie froschartige
keinen Schwanz
2 fa Eydechsenartige
haben einen Schwanz.
patrachii salientes ecaudati
ihr Körper ist oval
Füße ziemlich lang 4–5
Zehen nicht giftig ausgezackte
oder glatte Einladen

3 Gattung

1 G. — Hyla Baumfrosch.
Nakten warzenlosen Körper
langen hinterfüße, an den
Spitze der Zehen ist eine kleinen
artige Muschel
Hyla arborea. Laubfrosch

2 G. Rana
nakten glatten Körper
länglichten Körper frische leg
ihre ~~[illegible]~~ eyer in Klumpen
gekrebte Kinladen
— pipa Surinam
wegen ihrer fortpflanzung
merkwürdig
— esculenta
— —
— Bufo Kröte
warzigten Körper fast gleichlang
füße Zehen nicht verbunden
zahnlose Kinl. legen die Eyer
in Ketten
1 Bufo cinereus graue
2 — viridis in Sümpfen
— igneus Feuerkröte

2 G. Patrachii repentes
langgestreckten Körper 4
meistens gleichlange füße
ganz glatte Haut
kein äußeres Trommelfell.
2 Gatt. alia cauda anceps zweyschaden
1 G. Salamandra Salamander
warzigten Kö: porösen zwendlichten
Schwanz gleichen den Kröten
1 A. Salamandra vulgaris Molch
ist ganz unschädlich 6–8 Zoll lang.
2. — atra Tyrol
2 Gatt. Triton Wasserhal.
glatten Körper zweischneidi.
zusammengedrückten Schwanz.
— lacustris leben im Wasser die gemeinste
— palustris Rückseid. grösser.
Reproduktionskraft

Ichtyologie

Fische haben vollkommnes Skelet
rothes kaltes Bl. einfaches Herz
mit einem Ohre. keine Lungen
bewegen sich vermittelst flossen
Kiemen u. kiestern Branchiae bestehen
aus einer Öffnung die halbmondförmig
ist und mit dem Kiemendeckel
geschlossen werden kann, die
Kiemen bestehen aus einer bogen-
förmigen Gräte an welcher die
zahlreichen Fransen oder Blätter
hängen. Sie athmen die Luft
des Wassers und nicht je
sie nehmen eine Quantität Wasser
in den Mund und lassen
es bey den Kiemen heraus
und —

Herz ist einfach eine Herzk: 1 Hohr
daraus entsteht eine Pulsader
die sich in 4 Aeste theilt, wovon
2 unmittelbar nach den Kiemen
gehen

vesica aerea. Schwimmblase ist das
merkwürdigste Theil des Eingeweids
liegt in der Bauchhöhle
neuere Versuche haben gelehrt
das die Blase mit dem Mund
mit dem Magen durch kleine
Kanäle verbunden, bey einigen
nicht. in der Luftblase
ist bald reine Lebenslüft, und
kohlensäuren oder Stikgas, oder
brennbares Gas.
Man glaubte sie diene sich schwerer
und leichter zu machen, daran
ist gar kein Zweifel

Der Körper ist entweder mit hornigen
Schuppen bedeckt, oder glatt schleimig
er ist meistens von den Seiten
zusammengedrückt, oder von oben
nach unten zusam. od. rund &c.
Die flossen pinnae
jede flosse besteht aus zarten Gräten
die durch eine Haut verbunden
sind; und jede floss an einem
eigenen Knochen festsitzt

Rückenflossen pinnae dorsales
sitzen auf den Rücken sie dienen
zur Wendung
Brustfl. — pectorales gleich hinter
den Kiemen, fehlen fast nie, dienen
zum Heben und Aufsteigen
Bauchfloss. — ventrales liegen am
Bauch ~~oder~~ am Halse noch vor
den Brustflossen
oder nach den Brustfloss petoracici
oder am Bauche selbst abdominales
einigen fehlen sie gänzlich — apodes
sie dienen um sich in die Tiefe
zu bewegen
Afterflossen — anales
dient zum lenken
Schwanzflossen caudales endigen
den Schwanz dienen zum Vor-
wärtsstossen und Wenden.

Fische haben keine Stimme
pflanzen sich durch Eyer fort
keine eigentliche Begattung
Süsse und salzigte Wässer

Fleisch Pflanzen
Systeme 2 Abtheilung
Pisces spinosi Grätenfisch
— cartilaginei Knorpelfische

Cartilag. bestehen aus 2 Ord.
1 Ord keine Kiemendekel sond
mehre Spiracula solit:

2 haben eine Öfnung keinen
Kiemendekel

2 Abtheilung besteht aus 4 Ord
Pisces spinosae apodes.

— jugulares die Bauchfloss: vor d: Brust
— thoracici die B:flo nach den Brustfl.
— abdominales auf den Bauch.
1000 Art Fische.
Rayus Artedi La Cepede Bloch
Meidinger
1 Ord. Pis
Petromizon Lamprete
7 Spiracula solitaria
weder Brust noch Bauchflossen
einen Mund zum Saugen
— marinus
— fluviatilis.

Raja zusammengedrückten Körper
die Kiemenöffnung unten am Halse
lebendig gebährend sind die Mann meisten
die Großen Mund spitzige Zähne
— glavata Stachelrochen 12. Fuß europäische Gewässer
— torpedo Zitterroch elektrisch
2. 4 f. Mittelländisch Meer die Elek-
trische Kraft ist vorn am Halse
an den Seiten. Bey der Rochen ist eine wahre Begattung Eyer in einem Sack.
Squalus Haifisch
langestreckten rundlichten Körper
großen Rachen fürchterliches Gebiß
— pristis nördliche Meer. Schwertfisch
mit gezähnelten Schwerte
— carcharias Seewolf feine Zähne
sind häufig auf Malta versteinert
unter den Nahmen Glossopetren.
2 Ord. Branchiostegi —
1 G. Acipenser Stör mit Bartfäden (Cirri versehen)
Körper mit Reihen von Schildern
bedeckt keine Zähne
— sturio 6. 12 f. gemeiner Stör
— stellatus Sternstör
— huso - 20 f: Hausen

Sygnachus. Körper wie aus
mehreren Gliedern zusammengesetzt
sind scheinen.
— apus
— hyppocampus Meerpferdchen.
Pisces spinosi Grätenfisch
1. Apodes Kahlbäuche
1 Ga: Muraena Aal.
sehr langen schuppenlosen Körper
ohne Bauchflosse. die
— anguilla - g: aal.
2 G. Gymnotus Finnäle
keine Rückenflossen, die pinna
analis auch sehr lang bis an die
Spitze des Schwanzes
— electricus. Zitteraale.
i Surinam Cayenne.
Xyphias Schwertfisch
Schwertförmigen Verlängerung des
Kopfes.
— gladius - bis 20. f. Meere

1-

2. Pisces jugulares

Gadus platten Körper 7 Strahlen in der Haut die die Kiemen bedeckt

— morrhua.

— Lota Kalrutte im Flüssen aus der Leber bekommt man ein Oh wieder die Flecke.

— Thoracici

Trigla volitans fliegender Fisch. Atlantisch. Meer.

Perca ausgezackte Kiemendeckel spitzige Pinnae stachelige Rückenflossen.

— fluviatilis Fluschbarsch.

— lucioperca

— cerva

— zingel

— Pleuronectes Schollen

plattgedrückten Körper die Augen auf der obern Seite des Körpers.

Echeneis Schildfischen

Scheitel platte mit Runzeln zum Saugen

— remora

40. Abdominales Bauchflossen

Cyprinus Karpfen

glänzende Schuppen keine Zähne

— barbus Barbe 7 Bartfäden Cirri

— carpio g. Karpfen

— tinca Schleye 2 Bartfäden

— auratus Goldkarpfen ursprünglich China.

— alburnus Weißfisch.

— gobio

Exocoetus lange Brustflossen

— volitans fliegen: Hering

— Clupea zusammengedrückten Bauch. Eismeer. im Frühjahre an die Küsten südlicher Länder

— harangus.

— Salmo Lachsen

eine Fettflosse auf den Rücken

— salar: Ost: Nordsee auch zur Leichzeit in die Flüsse

— trutta Lachsforelle

— fario Forelle

— hubo

Esox plattgedrückten Kopf unterer Kinnlade verlängert Raubfische.

— lucius gemeiner Hecht.

Cobitis.

Augen sehr hochgestellt

— fossilis Misgurl Wetterfisch

— barbatula Grundel.

Silurus Wels.

Bartfäden den ersten Radius der Floß stachelig

— glanus gem. Schwid. 1—20 f.

— electricus Nil.

Ard. Ardea agami - Taenicat Monost
" Ascal. in d. Magnes.

29. Crocio - Vinaceo 1 ms. 4 Kiend. farcy
acad d. Magnes a Ligulis - exst

30 Sacc Sueur
42 Kiend. Kiend. Kiend.

Naturgesch.
Notizen
Ornithology
Notizen

Cathartes	4	4
Polyborus	5	
Falco	6	
Aquila	6	
Buteo	10	
Cymindis	3	
Milvus	3	
Astur	26	59
Strix	11	
Otus	6	17
Opistocomus	1	1
Prionites	4	4
Corvus	9	9
Icterus	31	33
Sturnus	2	
Turdus	18	
Myiothera	102	
Thamnophilus	61	
Baris	13	74
Coracina	3	
Gymnodera	1	
Cephalopterus	1	
Querula	1	
	327	7

Ampelis	9	
Casmarhynchus	2	
Procnias	4	
Rupicola	2	
Phibalura	1	
Pipra	32	56
Todus	5	
Platyrhynchus	6	
Muscipetta	1	
Tyrannus	2	
Muscicapa	105	
Tyrannulus	22	141
Synalaxis	22	
Dacnis	2	
Hilophilus	11	
Sylvia	6	
Thryothorus	10	
Emberiza	4	
Chlorion	3	
Pyrrhula	21	
Fringilla	27	
Euphone	15	7
	312	

Tanagra	68
Betglus	1
Coccyzus	14
Crotophaga	2
Trogon	11
Ramphastos	8
Pteroglossus	16
Capito	12
Monasa	9
Picus	36
Picumnus	8
Galbula	11
Psittacus	62
Oxyrhynchus	1
Dendrocolaptes	37
Xenops	5
Annumbius	5
Anabates	23
Opetiorhynchus	8
Coereba	5
Trochilus	63
	405

Alcedo	6
Hirundo	14
Cypselus	8
Caprimulgus	24
Nyctibius	4
Columba	19
Tinamus	20
Perdix	4
Penelope	14
Crax	8
Psophia	5
Microdactylus	1
Palamedea	2
Rhea	1
Hematopus	1
Arenaria	1
Strepsilas	1
Vanellus	2
	135

Charadrius	6
Himantopus	1
Aramus	1
Eurypyga	1
Ardea	15
Cancroma	1
Ciconia	2
Phoenicopt.	1
Platalea	1
Tantalus	1
Ibis	7
Numenius	2
Tringa	5
Totanus	7
Limosa	1
Scolopax	3
Rallus	6
Gallinula	10
Parra	1
	72

Fulica	1
Podoa	1
Phalaropus	1
Podiceps	2
Rhynchops	1
Sterna	8
Larus	3
Procellaria	2
Anas	11
Mergus	1
Carbo	1
Tachypetes	1
Sula	1
Plotus	1
	35

1286 Species

No 9ma – variat cuyabá – ist Falco vitticaudus – Neuwied
3 Jäner 824 –

Zu 773 Matogrss. gehört als Varietät der Falco No
in Pará im Garten am 13 Okt 834 geschoss

Zu 876 Borba – gehört No. vom Stanislao gekauft

Falco sparverius vom Rio branco scheinen eine eigene
Art zu seyn verschieden von den südlichen
vielleicht – F. dominicensis

Falco crotopezus No. 7 – 698 – und 482 – ist ein
und derselbe Vogel – der alte Vogel heisst
~~[illegible]~~ – (unicinctus Tem. Tafel
313 –

Falco 483 – nachzusehen – wo her

No 304 – Falco xanthothorax zerfalls in 4 arten die erste ist der Waldspeck

304 b – 1 alt ms – Matogrss. 20 Sept 28 –
1 f. jung. Borba 6 May 830,
1 f. jung S. Sabinet 4 Jäner 31 –

304 ? 1 alt ms. Marabit – 21 Jäner 31 –
1 f. jung Barra – 27 Aug 33

304 c. von Pará 3 ms alt – 3 Dec. 10 Dec. 10 Okt. 34
einer scheint doch ein junger zu seyn

Falco nº. 925 - von Barra do Rio negro. 31 Okt mas
ist im Temink als Falco melanops. Daudin abgebildet
nº. 8. von Sai ~~ist~~ scheint Falco lacernulatus Temint
jüngerer Vogel zu seyn.

Falco. nº. 345 - Yparen. 6 Feb 19 - jung
nº 563. Paraná. 9 May 23. foem.
— 345 - Para 8 Okt. 34. fo. alt
— 1039. 2 mas als Barra. 3 May. & 13 Sept 33.
1 f. alt Bar. 23 Okt. 33
} alle eine Art —

Falco ~~femoralis~~ pileatus - nº. 508 - Murungal. 1 f. alt 821 -
nº 558 - 1 f alt Sacrum 5 May 28 -
— — 1 m 1 f alt Rio Paraná 29 Ag 11 May 23 -
1 jung. Vogel vom Varnhagen. unt. d. Num. B 95 ? oder 508 ?
2 jung foem. Barra d. R. n. 26 & 28 Aug. 33 -
} alles dieselbe Art —

nº 395. nachzusehen —

nº 627 = la Buse mixte à longues jambes heißt F. gracilis bey Temink

nº . - die zweyte rothäugige Art heißt hemidactylus bey Temink auch Neuwied schreibt von beyden —.

Falco atricapillus - der erst von Yparema zu sehen ob Männchen oder Weibchen = nº. 520 = F. tebenna -

Falco palldatus im Habdukt liefert den schönsten Beweis daß
es bloß der Junge vom cayennensis ist — hat 2
neue Schwanzfeder einige auf d. Stirn und auf d. Kopf

No 388. von Sparema — soll ein junger cayennensis seyn und
ist noch bey Temink =.

Falco uniciactus. Tem.
Brit. Mus. Catal. Accipitres
Coll. Landbeck Barbados.

Falco psezopsoros. Meyeri.
Chili
Coll. Meyer Frankfurt a/M.

Falco biarmicus Tem. Coll. Mus.
Coll. Webb - Senegambien (Gambia)
Coll. Lazarus.

Falco cayennensis - in der Coll. Mus.
Coll. Lambert des Br. Museum
Coll. Gould - Cayenne
Coll. Bullock - Mexico
Coll. Bullock - Mexico
Coll. Bullock - Mexico

bey H. Burchell sah ich eine
Papagey in der Größe des Ochrocph
mit carniaroth Wirne und etwas
weit auf d. Heitl hinauf der
übrig Korpor ist grün
dann 1 kl. caprimulgus = gerad
schwänzig mit einer fahle Stich an der
Spitz der Feder auf d. Schwingfed
ein fahler Querfleck —
Oberleib braunlich grau mit schwarzbraun
sehr fein geschrenkelt ohne große
Flecken — war sehr zerstoßt
und hatte nur sehr wenig Schwanzfeder
Er konnte mir nur wenig Vogel
zeigen, da alles noch in Kist
vernagelt ist —

Sir/

I have not shewed the Bird skins to any one. I wish to sell the lot altogather - If you will let me know the most you can give - or preaps we can make a change - and I will come to your house any time you apoint

Your &c

J Harvey

Ar. lineat.	—	10 Sh
— agami	—	15
Fand. loul.	—	15
Ara blue	— 2	
Aloa bll.	—	15
Ciderus	—	15
—		20
Araca		12 Sh
Opisthocomus cristatus		

Pelekane des kais. Museum

1. Pelecanus Onocrotalus mas et fem aus der Menagerie in Schönbrunn.

2 — crispus Feldegg mas et fem adult ersteres aus Constantinopel letzteres aus Dalmatien

3 — crispus? aus London

4 — fuscus nach Dr. Czihak von Jassy, war früher als junger P. Onocrotalus aufgestellt.

5 et 8 P. brachydactylus wurde von Parreyss gkft ist viel kleiner als Onocrot. Vaterl? weißen Schwanz, schwarze Schwungfedern

6 et 7 — rufescens Lath. Ruppel Atlas pl 21, mas adult aus Nubien von Sieber und ein etwas jüngeres Exemplar von Ward aus London

9 — trachyrhynchus adult mit Warzen und den Schnabel auch ein junges Exemplar aus Nordamerika.

10 — gibbosus Nath von H. Lieber gkft ohne Vaterland. mit einem Höcker am Kopf.

11 — conspicillatus Temm pl. color 276 aus den Philippinen Inseln

12 — aus Chili mit weißen Halsstreifen von H. Tucker in London gkft.

13 — Tagus Licht. Saw-billed Pelecan. Shaw Zoology Tom XIII pag 117 Mexico. fem adult. mit weißen Kopf und Hals.

14 Pelec: Thagus * junges Männchen ~~ist aber schmäller~~

15 — fuscus aus Nordamerica
scheinen alle beyde jung zu seyn
und braun

16 einen großen braunen Pelekan
wie P. fuscus allein größer als fuscus
und Thagus; auch aus Mexico.

17 Pelecanarius von der Größe des Pelec:
brachydactylus jedoch mit grauen Schweif.
Gefieder weiß, Kopffedern und Hals mit Krausen
federn und Hinterschopf; schwarze Schwung-
federn gelben Schnabel kleinen Kehlsack
der Schnabel mit schwarzen flecken. ist
ein alter Vogel wahrsch. fem. aus Sumatra

ein junger Vogel der wohl größer ist
aus Ceylon v. Baran Hügel mit ganz grau
blos unterstücken und Brust weiß; auch
schon mit einem Schopf. es müßte dieß
ein junges Männchen seyn. der Schnabel
mehr Orangegelb mit größern schwarzen
flecken als bey N 17.



No 16



Brauner Pelekan aus Mexiko junger Vogel von der Größe des vom Chili No 12 ist noch jung.

Profil des Oberschnabeln in der Hälfte, wo er in der Mitte eine Langserhöhung hat

Von der Stirne an hat der Oberschnabel in der Mitte bis zur Drittel Länge des Schnabels einen Einschnitt. wie der schwarze Mittelstreifen zeigt.

n 17.



ein junger Vögel etwas größer scheint m jüngr zu seyn aus Zeglon. eben v Baron Hügel.

Pelekane des kais. Museum

1. Pelecanus Onocrotalus mas et fem aus der Menagerie in Schönbrunn.

2 — crispus Feldegg mas et fem adult ersteres aus Constantinopel letzteres aus Dalmatien

3 — crispus? aus London

4 — fuscus nach Dr Czihak von Jassy, war früher als junger P. Onocrotalus aufgestellt.

5 et 8 P. brachydactylus wurde von Parreyss gkft ist viel kleiner als Onocrot. Vaterl? weißen Schwanz, schwarze Schwungfedern

6 et 7 — rufescens Lath. Ruppel Atlas pl 21, mas adult aus Nubien von Sieber und ein etwas jüngeres Exemplar von Ward aus London

9 — trachyrhynchus adult mit Warzen um den Schnabel auch ein junges Exemplar aus Nordamerika.

10 — gibbosus Natt von H. Lieber gkft ohne Vaterland. mit einem Höcker am Kopf.

11 — conspicillatus Temm pl. color 276 aus den Philippinen Inseln

12 — aus Chili mit weißen Halsstreifen von H. Tucker in London gkft.

13 — Tagus Licht. Saw-billed Pelecan. Shaw Zoology Tom XIII pag 117 Mexico. fem adult. mit weißen Kopf und Hals.

Atricilla – von Delalande – Hab rein Sammt
schwarz Schwungfed. – d. 345 mit einem kleinen
weiß. fleck an d. Spitze sonst wie meine
brasilisch

Lar. cucullat – Licht Mexico alt
4 mittl. Fed, des Schwanzes grau –
kleiner als ridibundus –



1 – und 2 eben so

3

4 –

Die dubius – flügel sind weiß grau –
die außenfahne der erst Schwingh ist schwarz
Mode weiß grau

le curucau plombé
— — rasé —
Tant. cayennensis —
Ardea scolopacea —
Tant. rub. jung —
Ampelis cotinga nicht cordonbl —
— magnana —
— cucullata —
— mein ostro purpurea —
Amp. pompadoura Weib —
— alcado der ganz kleine
Himantopus — der brasilisch
— die zwey schwarze Arten
Char. pinnatus
— azarea —
Ard lineata alt
Tinam brasiliensis
toro —
die kleine Taupa —
d. rostf. wachsel —
Pend. constat 2 branco
Fal. tyrannus —

Lar. poliocephalus antiq. Tauling als
Provinzfoch, Schwarz — mit weiß Wachs faciliquum
d. weiß —, dann d. 1 & 2 Brin mit meinem weiß
Kopf an bey Sachen — mein Jolo vor d. Zeit —
Aftenstiegl weiß
4 — adriocolla — d. f. Tauling
Sch. klein, ob & nicht auch weiß nicht vorn —
neue Spreufoch grauliche — Kopf ginnlich dunkel grauliche Schwarz
Ob Lot 6 Tal d. fleißt ginnlich [illegible] gra
Prisnor. grau mit Flug 1 & 2 mit braun auf
weiß, Schwarz 3 & 5 mit weißen Zeit und
das Schwarz nicht so braun — d. ibrey mit weiß
Zeit — d. 1 Brin. Jol. 2 auf Sachen ganz Schwarz
Seeindan. alle mit weiß Zeit

Larus. glaucus.
— glaucopterus Kittlitz
— niveus Pallas
— argentatus
— leucopterus
— leucophaeus Licht.
— Audouinii -
— canus.
— tridactylus
— gelastes.
— brevirostris Brandt
— Jamesonii
— argentatoides. Rich.
— zonorhynchus
— brachyrhynchos -

— leuophthalmos.
— crassirostris.
— melanurus
— haematorhynchus
— Belcheri.
— polios
— eburneus.

Larus marinus.
— fuscescens -
— leucomelas
— dominicanus
— fuscus.

— ichthyaetos
— melanocephalus
— personatus.
— morio
— atricilla
— dubius. Feldeggii
— ridibundus
— glaucodes meyen.
— nigriceps Poeppig
— polyocephalus
— maculipennis
— Franklinii
— Bonapartii
Sabinii
Rossii.
minutus.

Schwanze.

1 Carbo perspicillatus Pallas.
12. Schwfdr.

2 — cincinnatus Brandt.
12 Schf

3 — penicillatus Brandt.
12 Schf

4 — cormoranus. Meyer
14.
medius Nilsson —
Phalac. carbo Pallas — alt —
? graculus Pall. Herbstkoy / L. Jung
5 — melanogaster Cuvier.
14.
lucidus Lichtenst.
leucogaster Meyer.
macrorhynchus Temm.

6 — graculus Linné. Gmel
12.
cristatus Tab. & Brün Gm
Demarestii Payreaudeau
Ph. cristatus & Demarestii
7 — dilophus Swainson Gould pl 410 - 411a
? C. macrorhynchus Gall. d Paris ?
Ph. dilophus Audub. pl 257.

8 — brasiliensis. Neuwied. Halicaus
12.
brasilianus Spix
Procellaria brasiliana Latt.
Fou brun de Cayenne Buff. pl. 974.
mystacalis Lesson.
Phal. graculus Nilsson.
graculus Tem
graculus. Gould. t. 408
Ph. floridanus Audub. p 252
Phalacrocorax niger King.
Zool Jour. IV. p 101.
L. Zaramagullon noir d'az.
car. gracilis Meyer.
mexicanus Brandt.
Hydrocorax vigua Vieillot Dict

9 — bicristatus Pallas.
12
urile. Gmel —

10 — violaceus Gmel —
12
pelagicus Pall.

11 — capensis Sparrman.
12
Mus. Carl. f. 110 t. 61.
africanus Licht.
violascens Brandt.

12 — ater Lesson Traité.
sulcirostris Brandt
brevicaudus — nobis

13 — pygmaeus Pallas.

14 — javanicus Horsefield
12.
— Gray. Ill. Ind Zoo.
p 10. f 9.
setifrons & melanograthos Brandt

15 — africanus Gmelin.
longicaudus Swainson

16 — dimidiatus Cuvier

Schwanze mit weissem Unterleibe

. Carbo carunculatus Forst
carunculat. Gmels
? imperialis King
x — magellanicus Forster
Gmelin
— leucotis Cuvier Gall. d Par
Phal: erythropus King Proc.
Z p 30 —
— Bougainvillii Lesson. in
Boug: Voyage p. 331.
? Phal. sarmientonus
C. albigula Brandt. King
12 — purpurascens Brandt
? P. cirrhatus Gmelin.
pl 14 Schwfd —
— varius Gmel Lin.
Pel. Pica Forster.
Cab hypoleucos Brandt.
— melanoleucos Vieillot
& Brandt.
— dimidiatus Cuvier.
Gallerie d Paris.
x — atriceps King
? albiventer Lesson Trait

Graur.

14. Gaimardi Less —
P. Gaimardi Garnot
Zool d. l Coquille pl 48.
Phal: cirrhiger King. Zool
14 fad. Jourr. IV. p 103 —
— punctatus Sparrman.
Mus. Carls. t. 10.
P. naevius Gml.
Spotted Shag Latt t. 104
— Gouldicones avium
tab —

Falco gyrfalco, A islandicus
Strix lapponica
— nyctea ganz weiß.
— funerea.
— uralensis
Turdus. Whitei. Eyton
Motacilla albe.
Parus sibiricus
cyanus
Corvus infaustus
Tringilla erythrina m. Sch.
— rosea id.
Emberiza fucata Pallas.
— rustica Pall.
— cia — aus Finland.
Tetrao medius. Sam
— albus. seu saliceti. T.
weiner Sommerkleid
rupestris.
Limosa rufa ms im Sommerkl.
Phalaropus platyrhynchos
weiner Sommertrass
Cygnus immutabilis Garrell
Bewikii Garrell.
Anas hyperborea Gml.
— bernicla. 2 ausgewachsene Jünge.
Anas mollissima } Sommerkleid
— spectabilis } wo sie fast schwarz sind.
— dispar ms Sch.

Larus canus. Sommerkleid.
— fuscus. im Sommerkl.
Procellaria.
Podiceps. cornutus & arcticus.
Colymbus balthicus Hornsch.

Schwarz –

1 Carbo cormoranus.

2 — melanogaster. Cuv.

3 — graculus.
cristatus
Demarestii

4 — dilophus Swains

5 — brasiliensis –

6 — violaceus. Sm.

7 — capensis Spar.

8 — ater Lesson
sulcirostris Br.

9 — pygmaeus

19 africanus. 3 mel. Lath

11 javanicus Horsf.

S. Mort · mitch Dieß Vorwort

mit weiß Unterleib

12 Carbo Bougainvillii
albigula Brandt
sarmientonus King

13 — hypoleucos Br.
ginq Flgdr fuscescens Vieill

14 — melanoleucos Vieillot
flavirynchus Gould
? dimidiatus Cuv

Graue

15 Carbo Gaimardii Garnot.

und eine Fremde Art

les quatre du milieu sont
terminées de noirâtre, les
trois plus extérieures de
chaque côté sont vertes
dans toutes leur longueur.

Edwards tabl. p 328
beschreibt den rostfarben
fleck im Nabe
aller Spitze der Schwanzfaden
schwarz breit

Buff. pl. 370 –
hat einen blau-schwarz ohne
schwarz Spitze – spricht mehr
d. Klein von Westindien
hat nichts rostfarbenes
im Nabe

Briss. Momot p 465 – t. 35
fig 3 au dessous de l'occiput
il y a un peu de marron

Momot. Latt. tab X –
Tom I – p. 338.
ist der mit dem rostfarben
Nahmen
– variegated Motmot nennt
[illegible] ein Obst Varietat

Momotus varius Briss
il est de la Grosseur d'un
Etourneau – mais il a la queue
beaucoup plus longue
il est variegé a tout le corps
de bleu, de fauve & de cendré
la queue est composée de
douze plumes noirâtres en
dessous – mais en dessus ~~du~~
~~mi~~ les six du milieu sont
d'abord vertes, ensuite d'un
bleu changeant en violet
ces deux couleurs se perdant
insensiblement l'une dans
l'autre & des ces six plumes

1 C. perspicillatus.
2 — cincinnatus.
3 — penicillatus.
4 — melanogaster.
5 — cormoranus,
6 — medius.
7 — Demarestii.
8 — cristatus
9 — graeul
10 — brasilius
11 — mexicanus
12 — [illegible] Mexico
13 — sulcirostris
14 — capensis Sparr.
26 bicristatus
27. pelagicus
28 dilophus

[illegible]
15 carunculatus
16 albigula
17 purpurascens
18 melanoleucus
19 hypoleucus
20 dimidiatus
21 Gaimardi
22 punctatus.
23 pygmaeus
24 africanus
25 javanicus

27
19 ant.
8 ant.
20 ant

28 ant
1 11 111

Anas metopias. Poep. } anas
— albipennis Licht. } regia.

Anas coscoroba. ist an chionis Licht.

Pelecanus Thagus.

Phoenicopt. rub. remig. albis.

Psittac. Taguilma
— cyanalysios.
— choraeus

Tr. cyanocephalus.

Tant. pillus.

Olis. chilensis

Capra Pudu.

Equus bisulcus.

Pinus pitius soll das nicht ein Fiskogel sey.

Ardea 4 act.



Mo

Folgende Vögel sind mir seit 1822 für Europa, als neu entdeckt bekannt geworden. Meÿer.

1. Falco Bonelli. Temm. pl. col. 288 Lesson T. 1. pag. 83. Süd-Europa.
2. Falco melanopterus. Savignÿ. Less. T. 1. p. 100. Temm. Man T. 3. pag. 33. Turin, Lille, Andalusien und Pfungstadt bei Darmstadt.
3. Strix ascalaphus. Savignÿ. Cur. Thierreich. B. 1. S. 482. Less. T. 1. p. 115. Temm. man. T. 3. p. 52. Sizilien, Sardinien und England.
4. Strix meridionalis (: Noctua meridionalis Risso, Nice T. 1. p. 32:) Less T. 1. p. 110 Bewohnt die Meeresfelsen bei Nizza, um während der Aequinoctialzeit Jagd auf die aus Afrika kommenden Vögel zu machen.
5. Lanius castaneus Linn. Lath. B. 1. Th. 1 S. 145 Wälder der südlichen Alpen Europens.
6. Corvus spermologus Frisch. Temm. Man. T. 3. p. 61. Frankreich und Spanien.
7. Corvus leucophaeus Vieill. v. Crabos. Reix. nach Forö. p. 51. Temm. man. T. 3. p. 56. Auf Forö. Ist eine Abart von Corvus Corax. L.
8. Garrulus cÿanus Pall. Lath. B. 1. Th. 1. S. 326. Schinz. N. G. der Vögel S. 46. Temm. Man. T. 3. p. 64. Häufig in Spanien.
9. Cuculus cinerosus Buff. Temm. man. T. 3. p. 277. England und Irland.
10. Sitta sÿriaca Ehrenb. Temm. man. T. 3. p. 286. Syrien und Dalmatien

11. Loxia leucoptera Gmel. Temm. man T. 3. p. 243. England, Schlesien, Franken.

12. Fringilla githaginea, Temm. man. T. 3. p. 249. Syrien, Italien, Griechenland, Süd-Frankreich.

13. Fringilla incerta Risso. Temm. man. T. 3. p. 254 Sizilien, Südliches Frankreich.

14. Fringilla borealis Temm. man. T. 3. p. 264. Zuweilen in Europa.

15. Emberizza palustris. Savi. Schinz Vögel tab. 50. Temm. mann. T. 3. p. 220 Dalmatien.

16. Emberizza caesia Cretschm. Temm. mann. T. 3. p. 225. Mittägiges Europa, Oestreich.

17. Emberiza rustica. Pall. Temm. man. T. 3. p. 229. Zuweilen in Nordeuropa.

18 Emberiza aureola. Pall. Temm. man. T. 3. p 232. Zuweilen in europäischen Rußland.

19. Turdus migratorius Linn. Temm. man. T. 3. p. 91. Selten in Deutschland

20 Turdus Pallidus } Pall. Temm. mann. T. 3. p. 97. Italien Griechenland, Sachsen.

21. Turdus sibiricus. Pall. Temm. man. T. 3. p. 98. Europäisches Rußland.

22 Turdus auroreus. Pall. Brehms Vögel Deutschl. S. 392. Breßlau, Brakonsiriot.

23. Turdus minor Linn. Lath. L. 2. Th. 1. S. 18. Italien, Griechenland, Sachsen, Brehms, Vögel. S. 393.

24. Cinclus Pallasii Temm. man. T. 3. p. 107. Crimm und andere Theile des europäischen Rußlands.

25. Motacilla melanocephala Feld. Dalmatien, einmal in der Schweiz.

26. Motacilla flaveola Gould. Temm. mann. T. 3. p. 183. Gemein in England.

27. Sylvia melanopagnon Temm. man. T. 3. p. 121 Dalmatien, Rom, Toskana.

28. Sylvia luscinioides Savi. Temm. Man. T. 3. p. 119 Toscana. Less. T. 1. p. 289.

29. Sylvia Rupelli Temm. man. T. 3. p. 129. Insel Candien, Less. T. 5. p. 293.

30. Sylvia icterina. Vieill. Temm. man. T. 3. p. 150 Holland, Frankreich, Rom.

31. Accentor Calliope Temm. man. T. 3. p. 172. Die Crimen und südliches Deutschland.

32. Anthus rufogularis Brehm. Temm. man. T. 3. p. 192. Sardinien, Dalmatien ξ: ξ:

33. Alauda Duponti Vieill. Temm. man. T. 3. p. 197. Hyéres Provence.

34. Alauda bifasciata, Licht. Temm. man. T. 3. p. 199. Candien, Syzilien, Provence.

35. Alauda Kollyi. Temm. man. T. 3. p. 202. Morea.

36. Hirundo rufula Levaill. Temm. man. T. 3. p. 298. Syzilien.

37 Columba aegyptiaca Lath zuweilen in Italien und Griechenland.

38 Charadrius spinosus. Linn. Zuweilen in Italien und Griechenland.

39. Numenius tenuirostris Vieill: Schinz Vögel t. 120. Italien z. B. um Rom.

40 Falcinellus cursorius Temm. Schinz Vögel t 126. mittägiges Frankreich.

41 Scolopax Sabini. Linn. transact. XIV. III. 556. Isis. England.

43. Tringa rufescens Vieill. Linn. transact XIV. 109. t. 11 Isis 18. Heft IX. p. 910 wurde zu Melbourne in Cambridges hire in England im September 826. geschossen und durch Yarrell beschrieben.

44. Larus Audoninii Payr. Less. T. 2. p. 387. Sardinien und Korsika.

45. Larus leucopthalmos Licht. Less. T 2. p. 387 Italien und Griechenland.

46. Larus Sabini Leach. Cuv. Thierreich B. 1. S. 834. Italien, Griechenland, Holland.

47 Larus argentatoides, Brehm. Beitr. zur Vögelkunde B. 3. S. 355. Seeland, Schleswig.

48 Thalasfidroma Wilsonii Bonap. An den Küsten von Spanien.

49. Cygneus Bawickii Yarrel, England und Bayern.

50. Anas gambensis Linn. Bewick: britisch. Birds 1826, II. p. 296. England.

51 Anas glocitans Linn. transact. XIV. III. 559. Isis 18. Heft. England.

52. Anser rufescens Brehm: Gemein auf Island.

53. Mergus cucullatus Linn. England.

54. Pellecanus crispus Schinz Vögel t 132. S. 393. Dalmatien.

55 Carbo Desmarestii Payr. Less. T. 2. p. 373. Corsica und Sardinien.

Folgende Vögel sollen in Europa entdeckt worden seyn. von wem? und wo? das muß noch näher erforscht werden.

1. Falco fasciatus.
2 " pisanus. Bei Pisa.
3. Turdus Wernerii Bonelli. Turin.
4. Sylvia Cariceti Naum. Deutschland.
5 " Bonelli Savi. Italien.
6 Motacilla cinereocapilla. Bei Pisa.
7. Lestris Sessonii. Nordfrankreich.
8 Uria unicolor Faber. Island.
9. Merops viridis. Griechenland.
10 Charadrius melanocephalus. Griechenland.
11. Saxicola leucocapilla. Italien und Griechenland.

Anas castanea Florsefield.
ist d. opaca. Tem. d. arcuata.

Anas americana ist d. anas
chiloensis –

Anas obscura. Audubon. pl 302.
— bimaculata. Aud. pl. 338.

Anas. marmorata. Tem. und
anas angustirostris Mendt. führt
Bonaparte fälschlich als 2 verschiedene
Arten auf –

Anas vallisneria Wilson.
audubon. 301 –
Anas ferina Wilso. Aud. p 322
— american Aud. pl. 345.

Anas antarctica ms. Lesson Voyage
de la Coquille pl. 50 –

Sarnabel House –

Telmatias majores.

1 T — major Brehm. der an den Seiten größtentheils weiße Schwanz hat 16 Steuerfedern

2 — nisoria Brehm. der größtentheils weiße Schwanz hat 16 Steuerfedern —

Telmatias gregariae

1 T — faeroensis.
Schwanz 14 Steuerfedern.

2 — Brehmii.
— 16 Steuerfedern.

3 — stagnatilis
14 Steuerfedern.

4 — septentrionalis.
14 Steuerfedern

5 — gallinago Boie
14 Steuerfed.

6 — peregrina Brehm
14 Steuerfedern —

Apotheker
in Hohen elbe am Riesen
gebirge hat eine bedeu-
tende Vogel Sammlung –
Psittacus Caeindé – Arara –
soll nachweglich vom Ara rauna
verschieden seyn –

	L. argent.		Nova Species	
Tarsus	2 Zoll	2 L.	2 Zoll	—
äußere Zehe	2 —	2	2 —	—
Mittl. —	1 —	10	1 —	7 Lin.
innere Z. —	1	4	1 —	3

Hr Kittlitz sah dieselbe Meve auf dem rothen Meer, soviel ich aber erfahren konnte ist sie noch nirgends beschrieben, ich möchte daher, aus Rücksicht auf die großen Verdienste des H. Dr. Michaelis um die Naturgeschichte der Vögel Dalmatiens vorschlagen, dieser schönen Meve seinen Namen zu geben, unter welchem ich sie auch schon seit einigen Monathen, zur Unterscheidung von ihren nördlichen Anverwandten, in meiner Sammlung aufgestellt habe.

4 Larus argentatus. Unter diesem Namen erhält
ich aus Dalmatien eine Meve, die aller-
dings in jedem Kleide viele Aehnlichkeit hat
mit der im nördlichen Europa und bey
uns vorkommenden Silbermöve, aber neben
diese gestellt eine mindestens eben so starke
Abweichung zeigt als Jring: cisalp von
unserm Haussperling, besonders im voll-
kommenen Sommerkleide: junge Vögel
sind kaum zu unterscheiden.
Bey dem alten Vogel sind die Füße
schön hellgelb wie bey Larus fuscus,
der Schnabel viel lebhafter gefärbt
nicht allein der Unterkiefer, sondern
auch der Oberkiefer gegen die Spitze
roth, der Rücken dunkler grau als bey
unserem Larus argentatus. Die Schwunge-
federn und alles übrige wie bey dieser
Meve, doch ist nach den Exemplaren, die
ich zur Vergleichung habe, unser Larus
arg. merklich größer. Als Maßstab
zum Ganzen will ich hier das Verhältniß
der Füße angeben

Trochilus 427. longbe. 300 F. —
2 ♂ — 402 – blauflügl – 100 F.
— 471 arrthosbauch. 50 –
1 ♀ — 467. } jungen grost. Kurzschnabl 25.
1 — 466 } ältern — 120
1 — 469 } weib — 10.
470 } mas. — 40
1 – 460 ms. weißhosen } – 40.
1 461 fem. alt – } – 10
1 461 – mas juv. } – 10 –
1 – 459. mas. andern –
weißhos — — 25 –

Genus nov. – 25 Fr. eine andere
blaue Art verkauft ein frischer
a um 8 Frank = . jetzt zu 20 Fr.

61 – / 900 / 14 –
300
56

Cotinga —— pah 75 —— 36-
Insectivore 2 pah. 50 Tr. — 20
Tanagra. 175- —— 35-
Euphone 50 —— 25.
Cotinga Chin 420- —— 15.
~~Ps~~



Coppenhagen am 22' Okt 1838.

Vultur angolensis.

in d. Mauser
scheint daher alt zu seyn.

Länge 24 1/2 Zoll.
Flügel - 15 7/12 Zl
d. 4! Schwungfeder d. längst.
Schwanz etwas abgerundet. 6 11/12
4 Fed. war gemausert davon 3 nur
halbgewachsen
d. äußerst um 7 Li. kürzer

Schnabel vom Mundwinkel 2 1/4 Zl
— — d. Wachshaut ob 1 7/12
— d. Stirnfeder 1 Zoll 11 Li
— vom Nasenloch - 1 Zoll 7 Li
vom hintern Rande - da der vordere +
Tarse 3 Zoll
— bis an d. Feder 1 Zoll 8 Lin
d. Tarsen sind hinten & vorne beschuppt.
auch die Zehen nur an d. Spitze

+ verdeutlich ist

stehen 3 bis 4. Schilder, wovon der 3te Schild an allen Zehen oben eine Art Kiel formirt.

V. Klauen sind lang und stark gebogen

Hinterzehe lang.

Äußere	1 Zoll 5 Li	— Klau	9 1/2
Mittelzehe	2 Zoll	— Kl.	11 1/2
Innere	1 1/4 Zoll	— Kl.	13 Li
Hintere	13 Li	— L	12 Li

Schnabel schmutzigweiß. Wachshaut nakt. Haut an Zügel & um d. Ling braungelb.

Füße gelbbraun hell, die Schilder der Zehen dunkelbraun nicht stark.

Klauen matt schwarz.

Vultur hypoleucos.
White bellied Vulture Sand. & Selby. Ill. N. Scr. p. III. pl. 13

V. Regione ophthalmica nuda capite collo totoque corpore subtus albis, dorso alisque brunneo nigris, cauda nigra apice albo. male adult

V. brunneus, subtus pallidior area circa oculos nuda faen

The Vulturine Caracara Eagle?
Bennet Gardens & Menagerie of Zool Soc. II p 302.

two Specimens alive in the Zoological Gardens

ist Vultur angolensis – und
schon anno. im Museum Le-
verianum abgebildet –

Mittel des Becoeur. Rue Richelieu
n° 9. Die alten weißen Vögel
die fett oder geräuchert sind
wieder weiß zu machen.
Man löset Salpeter, Meersalz
und ein wenig Alaun in Wasser
auf, und wäschet damit
den Vogel, und läßt ihn halb
trocknen, dann schwefelt man ihn
Essig für Quadrupedes statt Alaun.
Zum Aufweichen der gebahnen
Vögel nimmt er Weingeist.
für die Schnäbel und Füße
aufgelöste Seife.

Preservativ. de Becoeur.
Arsenic salamoniac, Sal marin
Savon blanc. Alun.



Buceros

1 — Buceros Rhinoceros — Isle de la Sonde —

2. — monoceros. — B. malabaricus. pl. Vaill pl. 9–10. — Buff. pl 873

3. — cassidix. Sm. pl. 210 — Isle de Celebes

4 — bicornis. — Vaill. pl 7 — pl 4. — Sumatra

5 — abyssinicus. — Buff p 779 — afrique sept

6. — hydrocorax. Buff pl. 283 — Philippines

7 — galeatus — Malacca Borneo ~~Bore de Papous~~

8 — plicatus — Java Banda Vaigiou Vaill ois d'Af. pl 239 —

9 — violaceus — Le Vaill. ois var. pl 19 — Aglan

10. — subcristatus. Sm pl. 69 — Philip

11 — malabaricus. Lath. Sp. 6 — albirostris. Shaw. — Sonnerat tab. 121 — & Vaill. ois rares pl 14 — Java Sumat le Cont. de l'Ind —

12 — panayensis — Buff pl. 781–780 Philippines

n° 13. Buc. gingianus Lat.
Sonnerat tab 121. Vaill. pl 15 Inde

~~Touc~~
n° 14. B. exarhatus. pl. col. 211 Celebe

Touc
n° 15. B. fasciatus Shaw Vaill ois d'af. pl 233
vol. 5 – Afrique – Angola —

Touc
n° 16. B. coronatus – Shaw Vaill ois d'af
vl 5 – pl. 234 – 235 – Afr. meridionale

Touc
n° 17. B. gingalensis – Shaw – Vaill
ois – pl 25

n° 18 Touc nasutus Lath. Senegal
bimaculat. Licht – Buff. p 890 –
vaill – ois d'Af p' 236.

n 19 Touc erythrorhynchus. B.
leucostictus. Licht Senegal –
Brisson tab. 46 – g 2 – Buf pl. 260 –
ois eau adulte – Le Vaill ois d'Af. vol 5 pl 238
jeune age —

Nachtrag

20 1. Buceros lunatus — pl col. 546. Java Banda

21. 2 — galeritus - pl. col. 520. Sumatra Borneo

22 3. — elatus. pl. col 521. f. 1. Pat. inconnue

23 4. — cylindricus. pl 521 f. 2 — inconnue

24 5. — anthracicus — pl 529 — Borneo Sumat

25. 6 — corrugatus pl. 531 — Borneo

26 7 — gracilis pl 535 — Borneo

27. 8 — buccinator — pl. 284 — Afrique

28. 9 — comatus — Sumatra

29. 10. — convexus — pl. col. 530 — Java Borneo

30. 11 — malaijanus. — Raffl. Lin Trans pl 13 p 292
Hügel Sumatra — Malacca —

31 12 Toco — cineraceus. Nepaul —
nin Toco —

Tundus ecinome — pl. col. 514 — Jap
ist Naumannii

16 ant —
1 mai —
1 atratus —
18 ant

— Noticias antecentes, curiosas, e necessarias das Cousas do Brasil in Padre Simão de Vasconcellos Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil —

Pater Joseph de Anchieta arte da lingoa brasilica Lisboa. —

Herva de Bicho — Absind — als Klystier und bad für Erweiterung d. Mastdarmes. O Largo —

123. d. Paraiba entspringt in d. Cap. v. Minas geraes fließt zwisch d. Serrados Orgãos und v. Mantyuin in östlich Richtung herab —

p196. am fluß Pirakäänaue (grosse Fischfluß) findet man noch große Haufen von Muschelschaalen überrest d. Nahrung d. Wilden —

210. Gibão d'armas. Panzerrock
Mundeos. baumfallen.
Fojos fallgruben

267. Tocayas, sind Plätze welche sich d. Wilden im dicken Wald zubereiten, um ihre Feinde daselbst im Hinterhalt zu erwarten —

Cocos de Piassaba; aus d. verwelkten Blattscheide ~~die~~ zerfällt in lange holzige Fäden aus denen man Streiten dreht.

— Noticias antecentes, curiosas, e necessarias das Cousas do Brasil in Padre Simaõ de Vasconcellos Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil —

Pater Joseph de Anchieta arte da lingoa brasilica Lisboa. —

Herva de Bicho — Absind — als Klystier und bad für Erweiterung d. Mastdarmes. O Largo —

123. d. Paraiba entspringt in d. Cap. v. Minas geraes fließt zwisch d. Serra dos Orgaos und v. Mantyuin in östlich Richtung herab —

p 196. am fluß. Pirakäänam (groß fischfluß) findet man noch große Haufen von Muschelschaalen überreicht d. Nahrung d. Wilden —

210. Gibaõ d'armas. Panzerrock
Mundeos. baumfallen —
Fojos fallgruben

267. Tocayas. sind Plätze welche sich d. Wilden im dicken Wald zubereiten, um ihre Feinde daselbst im Hinterhalt zu erwarten —

Cocos de Piassaba; aus d. in verwelkten Blattscheide ~~die~~ gefällt in lange holzige Fäden aus denen man Streiten dreht



Crax Piori 1 f
30
1 f. hl. Ascarides
aus d. blind Da

Frog. melanurus
1 ms –
4 Rind. – mitt. zwisch. 5 M.
17 Echenaß – fest
alle frag. – flach –

1 ms. 1 Spirapt
zwisch. d. Mag. haut



75 Caraffel Dist –
Rindw. 21 – verschied.
8 Echen

Barra

Lui Dias Franco



Dos Jazi as Maos a 10 como

– 1 f
2 Rindw. d. Unda



Carnisem 1 m
1 Rind. mit



Barr

Tracya 1 m
29 May 833,

Jaú Dosi Pedro
Katalb. 25 –

Hirundo purpurea
6 Both. mit Kopf Fußpf.
2 fragait
1 ms 1 Both. 1 Pila gross
1 m. 4 Both. mit Kopf –
2 Caraffel. Tacn. 1 mit Kopf mit frag.
1 Rind. – mit Kopf sec. Oder

Recebi do [illegible]
a quantia d[illegible]
que o S.r Sarg.te [illegible]
para comigo ra[illegible]
constar a V[illegible]
clareza [illegible]
d. 1833.

6/ 32 -/

12
12 -
8
32 -

13 -
13
26 -
6



Tapirus

Barra
Ohio negro

832.

832.

833

Ichnius

Corovina - Pescada

Fort. d. Rio branco. März 1832.

1. f. ausgest

Tucunaré -

1 f. ausg. Fort d. Rio branco
8 April 832

Tapirus

americanus 1 f. pull.
Borba 11 July. 830

1 f. alt. Haut.
Fort d. Rio branco Feb. 832.

1 f. alt Haut
Fort d. Rio b. 16 März 832.

1 f. pull. ausg. 3 Monath. alt
Sjön. Barra. Jäner 833

Crocodilus –

Jacarétinga nº.
wie von Marabitanas ?

1 ms ausg. Fort d. K. branco
gew. 6 Jäner 832
1 dto. mas größ. Forte d. Kiob.
18 Janer 82
1 f. größ. ausg. von Marabitanas
9 May 1831 –
1 ms größer. aus. Barra. 8 Okt 32
Jacaré coroa. 1 ms ausg. –
F. d. Kio branco. 30 Decb 831.
— — 1. – ausg.
Fort d. Kiobo. Decb – 831.

Salmo –

— Flura – 1 f. – Kio Cauamé
28 May 1832.
— 1 f. – Kio ana vau 4 July
832.

Mamori – cauamé 28 May
1832.

Taraqui 2 f. – Barra do
Kio negro.

Piranha branc. vom Kio branco
April 832 – ausg

Silurus

Piraüba – ausgestopft
139 fo. Borba 15 July 830 –
1 f. gr. ausg. Kiobranco 832.

Caparari – nº. 29 f. Torobim
f. ausgestopft –
Kiobranco. 832.

mestiço nº 129 – 1 f. –
Caravatay – / carauman.
15 Juny 832. Kio branco

1 [illegible] Jacaré guaçu
nom Rio branco

1 bl. Jacaré guaçu von der
Barra do Rio negro

N° 146. Schandiá - ms -
Barba 12 July 832 -

1 f. Rio branco. 1832 -

Piracatinga. Rio branco.
2 ms - 11 Jäner 832 -

Testuda

Tracaja petiú
1 f. ausg. Rio branco 26 Juny 832 –

Tracaja — nº – 175 –
1 f. ausgestopft –
Forte do Principe 13 Aug. 1829 –
1 f. gross von Rio Solimões – Barra 8 Oct 832

nº 188 –
Fabuti aperema 1 f. ausg. Borba. 4 July 830 –

Felis

— Jaguatirica 1 f
Cauamé. Juny 832

— onça 1 f alt. Fort d. Rio branco 18 April 832.

Trichechus

Pincboy. filho Forte do Rio branco 26 April 1832. Mas –

— 1 gross. mas – Haut Rio branco – 24 Jäner

Bradypus.
3 dactylus. 1 f.
Borba 2 July 830 –

Cavia
aguti 1 ms – Barra Dub

Cataphractus –

Vacú. nº.
3 f. ausgestopft Forte do Rio branco 17 April 832.

Cuiucuiu – focinho de porco.
1 ausg. 1 f Riobr. 1832 –

Simia

Caiarara - ms - Barra
30 Sept.b 832 - -
— 2 ms filho Barr. Jan. 833

Macaco prego. mas Barra
Nov.b. 832.

Gaissara d. 30 Okt 25.

am Sangrador, wo die Bororos ihre Ranchos hatten.

Buteo Harrisii Audubon Syn. p 5. n° 5. pl. 392.

698 Falco. unicinctus Tem. pl

jung im Anfang d. Mauser

d. nachwachsenden Federn sind nicht verschieden.

Iris dunkelbraun.

Wachshaut blaß. schmutzig gelblichgrün.

der Schnabel grünlichgrau / schwarzhell

d. Spitze beyd. Kinlach schwarzgrau

Füße schmutzig grünlich gelb.

Länge 23½ Zoll Breit 43 Zoll

d. Schwanz ragt 4¼ Z. ab Schleifst

mittelst Schwanzfed. 9¼ Zoll

d. Schnabel 1½ Zoll

hat Ähnlichkeit mit 482.

Matogrosso 29 Juny 27.
ich schoß ihn nahe an d. Stadt mit d. Windbüchse
als ich auf Colibris lauerte —

f. in d. 1 Mauser

Iris haselnußbraun.
das blaugraue des Schnabels geht etwas in
gelblich über, das übrige des Schnabels und
d. Füße ist wie an jenem von 23 May

Länge 21 4/12 Breite 41 10/12 Zoll
d. Schwanzrast 4 Zoll ub. d. Flügel
Schnabl. 18 Li
Tarse 3 1/4 Z. mittlst. Schwanzf. 8 1/2
im Kropf nichts.

Matogrosso 5 Septb 827
in d. Stadt in einem Garten, nachdem er ein
Huhn gefressen.
fo. jung
Länge 23 3/4 Breite 44 Zoll
d. Schwanzrast 3 3/4 Zoll über d. Flügelspitze
Mittlst. Schwanzfed. 9 Zoll
d. innere Hälfte d. Iris ist kastanienbraun, die
äußere graubraun.

Matogrosso d. 23 May 827 —
nahe an einem Hause lauerte er auf
einem Baum, auf Hühner.

f. scheint vor d. ersten Mauser.

Iris haselnußbraun, innerer Augen-
ring schwärzlich der äußere olivengrünlich
Haut des Augendeckknochen dunkelgrau.
Schnabelecken und Wachshaut schmutzig
gelbgrün.
Schnabel sehr hell blaugrau, die
Spitze schwarz. — Habichtsschnabl.

d. Habichtsfüße sind, schmutziggelb
baum ins grünliche ziehend. Die
starken Klauen schwarz.
Schnabl. 1 1/2 Zoll
Tarse 3 1/4 Zoll
mittlst. Schwanzfeder 9 Zoll.
Die äußere um 6 Li. kürzl.
Länge 22 5/12 Zoll Breite 42 1/4 Zoll
d. Schwanzrast 3 3/4 Zoll ub. d. Flügel

im Kropfe und Magen waren Stücke von
3 jungen Hühnchen.

Matogrosso 25. July 8287 –
in der Stadt in einem Garten geschossen wo er
den Hühnern aufläuert

s. alt.

Iris gelbbraun, mit dunkelgelbbraunen Wolk.
Wachshaut & Schnabelbeer blaßgelb –
Schnabel & Füße wie an d. Vorigen
d. kleinen Ob flügeldeckfedern dunkelrostfarben
Lang 21.3/4 Zl / Breit 42.2/12 Zl
d. Schwanzrast 3/4 Zll über d. Flügelschitz
Mittlst Schwanzfd 8/4 Zll
Im Kropf und Magen Stücke eines Hühnchens.

Joaquim Manoel

Manoel Joaquim

12 Marz 826. corvus chambi. Corvoceu 1 ms –
3 fuler. fang aus d Rauchfang.
nüler ? Sporogyli aus dem gross d fall Magen fang.
– Corvus simplicicornis 1 f. nicht ael ni nige
Amphist –

485.
13. Colaber Eriris – 1 ms mit 1 kurz bothrio.
aus d. Darm – d. Rind d magen – 485
Ligula fang aus d. Rauchfang – Echinorh fang
candidissima Gal. 479
14 ardea aequinoctialis. 1 ms. 4 Strud aus d. Magen.
1 Cestoid aus d Darmcanal.

Tringa praedata. maculatia 1 f. mit 2 fragmen
469. aus Saen. 1 mit kopf. 2 finden bruster fragm

Colub. 464. d. gestrunft 1 f. mit Ligula
469 19 Ligul ad. Ins fragment aus d Darm – 483 Cestoideen aus
aus d. Darmkanal in Rauchfang – 1 Distom ein Tetrath –
183 1 Physalopteren aus d. Darmcanal
Salmo Iaeu. spras mit 1 viel. kleinen und vielen
15 gross ascarid – und vielen Amphistomen aus d
479 d. Darmkanal – d. amphist. waren mittlich in leber und
umliegend fast alle. bei kleinen sind bauch fin nur in
Leistig
Salmo Iaeu. 1 f. wenig Alex nicht dick
167 ardea purpurea 2 f. 4 ms nicht –
12/14 Hydrois pischenetis Strud aus d Blinddarmen.
17/14 Ard. virescens jung 1 f. mit 8 2 16 –
Strud aus d. Magen. 2 Taen aus d. Darmkanal
Alcedo d. mit 1 f. klein 1 ms –

29

Onca pardo

24. Trist 20. Lage
mittg 19° Lag
Dan nachts 22°

25 1 f. wolkig trist 20°
mittg kurz vormittags 25° Lage
nachts 20°

22. trist wolkig mit Dong: 20° 4 Strongyl – 13 trist 20°
Dan schnee Lag – mittg 25° wolkig
wolk. mit Donn mittg 25°
nachts wolk. mit Donn
nachts 20°

1 f. 1 groß. Vivabat – 1 ms nicht
do. 1 ms mit 6. Echinorh fys in 24 f. 20°
– 1 ms mit 2 Echinor fys in und
lang Taenie mit kopf aus 6 fragmen
1 f. lang Taen. mit kopf

Rhynchops nigra 1. jung mit vielen
lang Taen. mit kopf. die eben mit 1 f. Halt
Vel im Darmcanal eines noch lang Saugwurm.
Darm. Monostomen und Distomen aus d. Darmkanal

Platalea ajaja. 1 ms 2 Dist. aus d. Darmkanal
amphistom & 1 f. kl. Taen. aus d Darm
– – 1 f 2 Distom aus d. Darm mit
amphist. und Taen. aus d. d. Ligula
– 9. Dist. fragm aus d Rauchf. d. Darmkanal
nicht bestimmbar
– – 2 f. 16 viel Dist. lang aus d. Rauch
Dist. in Darmkanal. amphist & Taen aus
1 ascar aus d Magen

27. Tantalus — curucau plombé. 1 f. —
mit langen Taen. meist ohne Kopf.
429 (4. Distom. gelblich und viele Amphistomen
6. kleine Dist. scheinen junge d. gelblich
— Tantal. dto. 1 f. mit wenig. lange & mehrere kurzen
429. Taenia mit kurz Hälsen und meist mit Kopf —
— Distomen wie der obige d. 1 langes
schmales Distoma rotbraun gesprenkelt — dann viele Amphistomen —
2 rundlich kurze Distom. an jedem Ende einer Mündung.
27. Ardea scolopacea 1 ms. mit bewaffnet
Distomen — dunkelhautfarben, die kleinen
— Ard. dto. 1 f. nichts —
— Falco der schwarze Sumpfweihe
nichts.
— Buco tamatia 1 m 1 f. 1 ax. intes
~~Bucco est si ennuyeux~~ selbe ist gerade und auf
einem Ende umgebogen
Falco. der schwarze Sumpfweih. 1 ms.
mit 2 kl. Echinorh. frey 6. Amphistomen —
1 Stumm wie 1 Distom. 1 Taenia ohne Kopf

29. Hellio. mit Sage auf d. Schnabel des Rückens 1 m 1 f
3 dk ax. coec.

31. Falco aurantius? 1 f. mit 13 Rundw. aus dem
Magen.
— Coluber m. 1 f.
1 mit flatten Echinorh. einzeln in Kapsel in d.
Bauchhöhle und im Fleische zwischen d. Rippen.
1 gelb. Rundw. außen auf d. Darmhaut in einer
Kapsel
2 Rundw. aus d. Darmkan
10 Fragm. von Ligula in 2 Kapseln auf auf
d. Darmkl. lösten sich gleich in Fragmen

2 Daner 26,
Anas moschata fer. 1 ms.
1 große Taen. mit Kopf
1 — — — aus 3 Frag.
2 kl. — mit Kopf.
3 kl. ohne Kopf.

O Porteyro dos Auditorios Joaõ de
Souza Pereyra trará em prassa a pregaõ
de venda os dias da Ley huma escrava Mi
nha por nome Joaquina tomada a pinho
ra a Joze de Paiva Soares a requerimen
to de Cruz de Abrahijo Coura da qual he de
positario Manoel Soares de Mello e pa
sará Certidam dos Lanços que tiver
Cuyaba 24 de Mayo de 1777

O Dr. do Judicial

Vaiz

Joaõ de Souza Rª porteiro dos auditorios nesta Vª e no
termo Rª Certifico em como trace a pregaõ de venda e arema
taçaõ pelas Ruas e Lugares publicos desta Vª os dias da
Ley os bens acima declarados no escrito de praça os quais
bens naõ tiveraõ Lanço algum. passo na verdade de que
dou minha fe. Vila da Cuyaba 9 de Junho de 1777

D 480r

Joaõ de Souza Rª

Nachmittags 4 Uhr K. Demit – [illegible] Südost – [illegible] Gebirge fängt im Ost Nordost an die höchste Spitze in Ost – die letzte [illegible] Berg in Ostsüdost – [illegible] Wolk bedeckt –

Richt. d. Fluss von Ost nach [illegible] in Südost [illegible] Berg

d. Ayudante v. S. Gabriel – [illegible] d. Leute von S. Jeronimo –

Rio Quereri verbindet mit d. Icanna – Ananas Manoel Galego schleppt Leute nahe von S. Jeronimo fort in [illegible] – Brandon [illegible] mittelst des Rio Icanna und Quereri – wo sie Coboeis fingen im Tiquié wurden Macus gefangen –

Dessana [illegible] Ling. Toccanna

4.900 –
5.000 –

8 July 831 –

Guariba verm. 1 f – mit 7 Taen mit Kopf. 1 Ohr.

27. braun lang die Stirn ein und auf d. Magenschleim und auch im Frosch bl. Asc. coec. mag.

1 ms. d. braun Stirn

amp. cayana 1 ms [illegible]

Mac. barriga blass b. Asc. coec. mag.

Cachoeira –

Macaco barriga 1 m. blass b. Asc. und Fila im d. Bauch

1 f – 11. Physalaspt im Mag. fast b. ein. Asc. coec. – viele Filar. 2 ganz [illegible] – Filarien –

Cavia aguti –

13. Trichocephal. coeci –

Colub. – mit Jararaca ms – [illegible] 3. Strongyl. aus d. Mag. Bandw. aus d. Dünd.

Myotha. mit Spitzschaft d. barr. 1 ms 3 ganz. Fil. 4 [illegible] cavo abd. [illegible]

Myotha von Icanna. 6 Taen mit Kopf

18. Boypeva [illegible] 1 ms. Filar. [illegible] mit Strong. fast in d. Bandw. lang [illegible] im Mag.

2 var. de pano – 800
1 faca – 320 –
Cinheiro – 400 –
2 v. ½ d. pano – 1000 –
1 lib. d. sabão – 400 –
Viscado fino 3 av. 1920 –
Linha – 60 –
4 ¼ d. alo – 100

400
200



Diz Joze Callado de Lima Cam.ª do judicial nesta V.ª q. elle Supp.e p.ª juntar a huma Causa q. tras neste Juizo com Ant.º de Puga Dantas Escrivaõ do mesmo, q. se acha appellada por parte deste a q. veyo o mesmo appellante com Em.os de se lhe receber tam som.te no effeito devolutivo lhe he nes cessario juntar certidaõ em como o D.or Dez.or Joze de Burgos V.ª Lobos antecessor de V.m. foi o pr.º ouv.or q. ouve nesta V.ª e sua Com.ª remettido por Sua Mag.de Ds. g.de a criar o d.º Lugar, como tambem do tempo em q. o d.º Ministro rezistou a sua Carta e ordem q. trouxe p.ª a d.ta Criaçaõ, o q. tudo a de constar do Rezisto da ditta Carta nos Livros da Camara ou da Ouvidoria e como o Escrivaõ dos ditos autos he o da Camara //

P. do q. constar, citado o Supp.do

Pra

Pa V.m. seja serv.º mandar q. citado o Supp.do appe lante lhe pase a d.ta certidaõ do q. lhe constar do Livro do Rezisto da Camara e sendo nesse o des te Juizo o entregue o Supp.do p.ª se pasar a cer tidaõ Requerida pello Supp.e no que //

R. M.ce

João Martins de Almeida escrivaõ da Camera nes ta Villa Real do Senhor Bom Jezus do Cujaba e seu termo, Certifico e porto fiz em como vindo o Capitaõ Antonio de Puga Dantas a Casa de mim escrivaõ o citei em sua propria pessoa por todo o conteudo na petiçaõ que o leo e me disse se dava

1/2

Se dava por citado em fee do que passei a
apresente em vertude do despacho do Doutor
Corregedor nesta ditta villa aos 17 de Julho
de 1737

João Mir.z de Almeida

João Martins de Almeida escrivão da Camera
e Almotacaria nesta villa Real do Senhor Bo
m Jezus do Cujaba por Provimento do Doutor
ouvidor Geral e Corregedor nesta dita villa e
sua Comarqua, e por nomeação do mesmo es
crivão de huã Causa Civel que corre em tre
partes de huã e outra Antonio de Puga Dantas
escrivão da ouvedoria, e Joseph Calado de Lima
Tabaleão &c.a Certefico e por to fee que re
vendo livro segundo do Registo da Camera
desta dita villa nelle a folhas dezoito verso
Tre dezanove se acha regista a carta do Cargo
de ouvidor Geral das minas do Cujaba de que
S. Mag.de que Deos g.de Ly merçe ao Doutor
Desembargador Joseph de Burgos V.a Lobos

Dom João por graça de Deos Rey de
Portugal e dos Algarves daquem dalem Mar
em africa Senhor de guine e da Conquista na
vegação Comercio de Etiopia Arabia Persia e da
India &c.a Faço saber aos que esta minha carta
virem que avendo respeito ao bem que me ser
vio o Bacharel Joseph de Burgos Vila Lobos nos tres
Lugares de letras que o Cupou, sendo o ultimo
o de ouvidor do Crato de que deu boa rezidençia
e esperar delle que assim o fara daqui indeante
em tudo o de que o encanegar, e atendendo ao seu

ao seu merecimento Hey porbem fazer merce
do Lugar de ouuidor geral das Minas do Cujaba que
fuy seruido mandar criar de nouo, por tempo de trez
annos e alem delles o mais que ouuer porbem em
quanto lhe naõ mandar tomar Rezidençia, e esta
baleçendo com effeito esta ouuidoria em que o nome
jo seruindo o tempo costumado á minha satisfa
ssaõ sera prouido em Lugar de Dezembargador da Rela
çaõ do Porto sem concurço, o qual Lugar de ouuidor
seruira segundo forma de minhas ordens, e auera
com elle ordenado proes e percalços que lhe direita
mente pertençerem, e portanto mando ao Gouer
nador da Capitania de Saõ Paulo, ou a quem seu
cargo seruir lhe de posse do dito cargo e lhe de
xe seruir e delle vzar, e auer o ordenado proes
e percalços como dito he, e outro sim mando aos
officiaes da Camera que ouer pessoas da Gouernança,
e pouo daquelle destrito lhe obedeçam, e cumpram tu
as sentenças juizos e mandados que elle porbem
de justiça e meu seruiço mandar sub. as penas que
puzer que seram com effeito executadas naquellas
que a sim o nam comprirem, e nellas incorrerem
e jurara na Chancelaria aos Santos Evangelhos
de que bem e verdadeira mente sirua guarda
ndo em tudo meu seruiço e as partes seu direito
de que se faraõ os asentos nesseçarios nas costas
desta carta, que por firmeza disso lhe mandei
passar por mim assignada, e selada do meu
sello pendente que se lhe cumprira inteira mente
como nella se contem de que pagou de nouos
direitos sinco enta e oito mil duzentos e
sinco enta Reis, e deu fiança a outra tanta

Tanta quantia e a pagar o que se le quidar dos emo
limentos no liuro terceiro dellas a folhas duzentas
e oitenta e oito que foi carregado ao Tezoureiro
no liuro treze de sua Receita a folhas trezentas e
quarenta e sinco, como seuio do conhecimento
em forma Registado no liuro doze do Registo
geral a folhas trezentas e sinco enta e hua uerço
dada em lisboa occidental a trinta de março de
de mil sete sentos e vinte e noue gratis // El Rei //
Carta do cargo do cargo de ouuidor geral das
minas do Cujaba Criado de no no de que vossa
Mag.de fes merçe ao Bacharel Joseph de Bu
rgos Villa Lebas por tempo de tres annos ca
lem delles o mais que ouer por bem
em quanto lhe nesse mandar tomar re
zidençia, e estabaleçendo com effeito esta
ouedoria seruindo o dito tempo a satisfaçaõ
de vossa Mag.de sera prouido em hum
de Dezembargador da Relaçaõ do Portto sem
concurço pella maneira que a sima se
declara. Para vossa Mag.de ver // e nesse
Continha mais o dito Registo, e uaj na
uerdade todo o Referido em meu Reporto ao
mesmo Liuro que fica em meo poder
e Cartorio que corri e comferi com o
propio liuro e esta passei em uertude
da petiçaõ atras e despacho nella por
to do Doutor ouuidor geral e corre
gedor nesta ditta Villa e sua co
marqua aos dezoito dias do mez
de julho de mil sete sentos

Sentos trinta e sette annos e eu
João Martins de Almeida escrivão da
Camara que o escrevi a signei e com
sertes

João Miz de Almeida

Cdo.
Com. pro mim ez
crivão com a propria

João Miz de Almeida

João Martins de Almeida ez crivão da Camara
e destes auttos certefico que em virtude
do despacho do Douttor João Gonçalves Pereira
ouvidor geral despedis a Apellação destes auttos
pera a Relação da cidade do Rio de Janeiro a Leas
pera a digo Janeiro a vendeo a Leas pera
a do estado Villa Real do Senhor Bom
Jezus do Cujaba 24 de Agosto de 1737

as pejem.
Almeida

João Miz de Almeida

Recebi as custas que destes auttos
tolavão ao Capitão Antº de Pugas Da
ntes como tambem

Phalaropus Wilsoni. Sabine

IV. Nro 83. p. 259.

Länge 10½"

Schnabel schwarz, schwach gekrümmt, Vorderkopf u. Scheitel hell aschfarben, Zügel schwarz, hinter den Augen breiter, u. kastanienbraun, Kinn u. Seiten des Kopfs unter dieser Linie weiß, Nacken weiß ins kastanienbraune, Bauch u. untere Theile weiß, zwischen den 2 braunen Streifen hinten am Nacken eine weiße Linie, Rücken u. Schultern dunkel aschfarb mit einigen kastanienbraunen Federn; Schwung- u. obere Deckfedern dunkel, die großen u. 2. Deckfedern leicht weiß gerandet, obere Schweifdeckfedern aschgrau, d. untern weiß, Füße schwarz, 1" über dem Knie nackt, d. 3 vordern Zehen gelappt, Nägel schwarz.

Hab. Nördl. Polar Meer.

Ardea leuconotus

Habitu & magnitudine nycticoraceos, sed diversa ab eo: genis griseis, superciliis, macula infra-oculari, gula & dorso infimo albis, collo & pectore pallide griseo ferrugineis, abdomine ejusdem coloris, longitudinaliter albo striato, alis canis, ferrugineo mixtis, cauda subtus dilute cinerea, pileo dorso & scapularibus nigris absque nitore remigibus virescenti atris. Adult.

Hab. in Senegambia.

Corvus hudsonius, Sabine.

IV. Nro 83. p. 259.

Mit Pica verwechselt.

Körp. Länge 7", Schweif 11½–12".

Auf dem Rücken ein lockerer Busch schwarzer u. weißer Federn. Kopf, Nacken, Brust und Obertheil des Rückens, Schenkel, Unterbauch u. Schwanzdeckfedern schwarz, Bauch u. Schultern weiß, d. 1ten Schwungfedern braunschwarz an der innern Fahne zum Theil weiß, d. 2ten u. größern Deckfedern glänzend blau, der erwähnte Busch unten grau, Schweif abgestuft blaugrün u. purpurschillernd, Schnabel, Füße u. Zehen schwarz — das Weibchen etwas größer.

Hab. Cumberland-house.

x Lesson Illustrations de Zoologie –

In Gray nicht zu finden.
Nach meiner Ansicht zu Campylorhynchus gehörig und als ~~falsch aufgestellt~~ Campylorh. (Furnarius) roseus Lesson in der Sammlung

Furnarius roseus Less-

Illustr. Zool. pl. V. mâle

F. rostro corneo; pedibus nigris linea alba superciliari; corpore subtus brunneo-ardesiaco, infra roseo. Abdomine lateribusque brunneis; fronte et ani plumis roseis – alis et cauda brunneis; pogoniis rubescentibus –

Long. totale 7 pouc. 4 ligne.

Habit. Brasilia. du District peu connu de San-José –

au Brésil vivent 3 fourniers
au Chili et aux Isles Malouines
il y en a deux especes.

Le Tournoir rosalbin Lesson
Illustrations de Zoologie
pl. 5 –

Troglodytes

Platyurus. Swainson

Troglodytes paradoxus Kittlitz

Meldung davon in Jardine & Selby
Illust. of Or. new Ser. No 6 bey
Scytalopus fuscus –

x vom C. Hügel

Troglodytes fumigatus ?

n° 826. 1302 –

2 Fs von Cachemir

Jungen Curucutary.

Sch. 10 1/2. Br. 4 Sch. 2 3/4 Zoll

d. ~~Schwanz ragt~~ Flügel L. Schwanz von gleich. Länge

– d. 21. Jänner 1819.

Savião tinga. nahe andern Morästen des Tamandatabuy.

alt.? stark in d. Mauser

drei schön gelbbraun, die untere Hälfte d. Auges etwas dunkler.

Nakt Hz. ist d. Aug. dtl. Knoch, röthlich aschgrau. Wachshaut, Schnabelecken, unt. Schnabelwurzel. schmutzig ~~grün~~ gelbgrün Schnabel schwarz, an d. Wurzel d. Ol. etwas wenig, d. Unt. Sch. aber fast ganz die Spitz ausg. blaugrau.

Fuß. sehr schmutzig weiß gelb., ~~und~~ Klauen schwarz.

Läng 2 Sch 1/4 3 breiter 4 Sch 3 Zoll.

d. Flügelspitzen ragen 1/2 Zoll ub d. Schwanz spitze

Jacret. in. Rio de Coraxuda
jung. Weib

Oben d. Lungen zu beyd. Seiten an d. Rippen anliegend, ein Luftsak – dörtbe sind länglich nach ob. zugespitzt – unten breiter und an d. Leber anliegend wo sie sich enden am Rückgrath sind sie getrennt

Es scheint als ob am untern Ende d. Luftsäk ein Kanal in an der Luftsäke gienge, die d. Ganze Bauchhöhle aufblasen – am Ende des rechten Lungenluftsaks fand sich eine deutliche Öffnung.

d. Lunge sind rund um die Rippen angewachsen und blasen sich stark auf

d. recht. Leberflügel ist viel größer beyde sind mittelst einer Haut am Magen fest – Gallenblase lang – am Magen anliegend, auf d. Unt. Seit d. rechten Leblappen – Magen groß d. fast rund häutig – ~~Eingeweide~~ Darmkanal lang ohne Blind d.

d. Mast. d. arm d. rich. lang ist erweitert sich schnell.

Cuiaba 1 Dec. 827.

– Coluber. n. sp. – mit Schildern unterm Schwanz. ms.
mit 2 kl. Echinorh. fest in Kapseln auf d. Mesentericum, und
1 Physalopteria aus d. Darmkanal –

9. Silurus Palmito de Serra. 1 ms mit 2 Pentastomen
einzeln in Kapseln außen auf d. Haut des Darmkanals
2 Rundsch. ebendaselbst in Fettnalen –
1 Pentastoma ♀ war fest gesetzt am Anfang und in demselben des Dünndarms ohne
Kapsel – d. Darmkanal hatte kein Loch wenigstens schien
es sich

16 – Loricaria – 1 ms
mit 51 Würmern einer neuen Gattung frey aus
d. Darmkanal

– L. 1 f. mit 16 Ascariden, am schwarzen Ende dunkelbraun
und 130 W. einer neuen Genus frey aus d. Darmkanal
– 1 ms mit 4 Rund. und 15 W. g. n. frey aus d. Darmkanal
– 1 ms mit 1 Rund und 12 W. g. n. fr. aus d. Darmkanal
– Silurus Palmito de Serra 1 ms mit 1 Bothr. frey aus
d. Darmkanal –
1 ms d. 2 Bothr. f. aus d. Darmkanal
1 ms. mit 1 Pent. frey auß. auf d. Darmkanal ~~in ein Kapsel~~
1 ms mit 2 kl. Pent. in Kapseln auß. auf d. Darmkanal
1 ms nichts.

– Muscicapa v. schwarz & gelbscheith von Goiaz 1 m. f. u. nichts
– Picus Halbrothscheith f. 2. nichts.

25 Dub. Das Gypsus v. Tatuira 1 f. ms mit 4 lang Saen
mit Kopf 2 sehr kurz dett 2 hint. fragment. aus d. Dünndarm
6 (1 war im Magen). 22 ganz 10 aufgesch. Ascar. und 1
22 kl. Echinorh. coeci. frey.
10 Vlademir
4 Loricaria domestica nichts – 8 f.

16

Cáceres . 13 Octubre 1827 12 geschossen.

aus Spanien v. Küste des fl. Paraguay - aus einem Cáno

Loricaria prehensilis - 1 ms -

Länge bis an d Schwanzspitz - 3 F. 9 Zll

d. Schwanz ist Wirbelschwanz: und nach unterwärts gebogen

22 1/2 Zll lang -

Das Fisch ist unbeschuppt. d. Haut ist glatt

ist punktirt mit Schwarzlichbraun

Mustang d. Schwanzes in d. Mitte 7 1/2 Zll. , dunkel

ist zusammengesetzt - Villa maria 16 Oct. 827 Caax alent. 1 m.

Bildung des Gebisses - 19/24 Ohrb 1 Stück mit B. auf d. Kinn stehend

4 ax. d 2 Zaun. Waicos.

Pecq mentissimus - weiß Kinn - ms

Der Kiemdeckel - Haut spitzwinklich, Fisch und

Kiemdeckel d Obst schwarzlich

Fisch. blauzeichnet weiß und gemischt Fleck

Länge 5 Zoll breit 7 4/12 Zll d Schwanz mit 12 L

Fisch hora in d Mais -

Länge 4 5/12 Zll breit - 1 Zll d Schwanz mit 10 L

Loricaria hyacint - 1 ms - mit gelbes

Fisch mannigfalt. - 2. Faen. mit Lage d Schwanz

Vorgedor. 2 Ohrb - 27

Loricaria hyacint - 1 F. mit Spitzgift am Kiemdeckel

sind an d Fisch gelbes Fleisch in Kapsel

Loricaria nisi [redacted]

Cingab. 31 Oct 826 -

Falco haliaetus 1 ms vo Largo nigro

Lat. spec. pescado de porco 1 m. 1 F. - mit 2800 d. Eingang

mit Fisch ein identisch, 2 Faen waren in d. Cingabung bis

jedes ein Unterschied bei auf ein Spaltet 2 Faen waren

335 Fischschwanz in d. Cingabung d. Schwanz - das Wachsen fasten

eingeschlossen Stimmen, das das in Mang einmund

3 Faen in d Cingabung -

5 Bothr. mit Kopf d 3 sind fragment

1 rob. mit 01 im Gaft. Dem mit Holz fraß gerissen

Salmito - mundabene. 4 -

Silurus Groupensis 1 F. F.

mit Band Stimmen mit d. dammbruch eing

Lepus brasiliensis nigr.

Jan

11 Salmo Piabinha. Piapara 2 F.

mit 10. Winkelaugen Stimmen mit d. dammbruch

Silurus bocca nigr - 1 F. - mit Hangaugen Augen

12 Lor Silurus - Cabeçudo 1 F. nigr

Schnr. Sto. 1 F. - mit 2 Bothrocephalus mit Kopf

in d 3 fragmenten ohne 12 Leg

12 Silurus Groupensis 3 Faen. mit

16. Bothrocephalus mit Kopf mit d. dammbruch

Cataphractus d. gross. 1 F. nigr

13 hor Loricaria melanopterus ms mit 2

Stimmen mit einem Gewicht von 1 Pfund

mit Mattogrosso

15 Nov. 827.

Silurus — Palmita — mit kurzem Cirrus — 1 mg
1 Pectoral. ganz in d. Basis fest v. Rücken deckt.
4 Bartfäden für Kinn —

15. Didelphis Quica. 1 mg. mit 17 Zähnen
auf 3 Blättern rein ist sonst Mosburg artigen am after
selbe waren ziemlich braun im Leben nicht fett nun
lang-fast fingergestreckt- schwanz lässt auf 2 end rollen
fest nach d. Leib zu fassen an.

13. Silurus Palmita. 1 f. mit. 1 Cent. in
ai am hassel eingef, auf d. Samenkanal -
mit 1 lang. Bartf. mit kopf rund 2 kurz. fragent. mit.
kopf auf d. Samenk.
1 f. mit 8 kl. Bartf. mit kopf $\frac{11}{2}$ auf d. Samenkl.

13 St Serrasalmo. 1 mg mit 7 Ascarid. aus auf d.
in fin einfassend Fettband
1 Bothriocephal. auf d. Samenk 1 ♀ fragment
ovarii ein mal rund

17. Gymnotus carapo. 1 f. misst -

Salmo.

26 ax. lumbricoid. an f. Mastdarm abgeg.

20. Gymnot. carapo 1 mg. misst -

Ponte do Guaporé - Salinas d. Philiberto -
in Wald am Rand d. flüsst - Mann gefallen -

Tanagra mit strohgelb Kehlfleck von 1
von Cambada de Chave gefleckt -
Iris fast dunkelb - Schnabel Fuss schwarz -
Lang 6¼ breit 1¼ Zoll - 9½ Zoll die Spann rund 1¼ Zoll
ab Flügel 9 - 1. Corrego Guado. 1 Oktb. Tanan rufen
Estiva velha Fruktig. 1f - mit 19 Ethmoid in d. Bauchfell
Nas Pitas 5 de Octubro 827. im flaisch davon Häuden
areias - Cotingas an einem

Felis onca. 1 f -
von d. Nasenspitz
Lang bis an d. Spannschwanz 5 F 9½ Zoll
Spann vom after - 20 3/4.
vom ohr bis an d. Schultergelenk. 6 Zoll
Umfang d. Hals - 16 ¼ Zoll
— first v. Vorn 25 ½ Zoll
— von d. Hinterf. 25 ¾ Zoll
— d. Arm am Ellbog. 12 ½ Zoll
— d. Hand am Leib - 12 Zoll
— d. Spann an d. Wurzel 6 ¼ Zoll

Japoimulgus Fruktig 1f.
misst -

Iris braungelb. Schlund rosenr

120 Eth. fo: 18 Bauchl. 1 f. 3 Stubenfliegen Kleid
45 fast ring Wurm - mit abgedrückten.
7 - Ei
30 - in d. Rinde Holzes

— Farinha - 3/4 -
Fisch. 1/4 -
Farinha -

184 -
110
18
45
182

4 Nov. 25.

Totanus limosus 8 ff. 1 m. nichts

Totanus flavipes. mit Taen. [illegible]

— — 1 M nichts

Tot. sein glottes 1 f. mit 3 Monat [illegible]

[illegible]

1 m
1 f.

7 Nov. Didelph. [illegible] ascar. [illegible]

Tinamus [illegible] 1 ms. mit ascar.

[illegible] Dist. int.

8. Bufo 2 [illegible] 6 f. 7 ms.

mit [illegible] Darab.

Taenden 2 ascar. [illegible]

[illegible] mit lang. Kopf

7. [illegible] Dist. int. [illegible]

2 [illegible] ascar. int. 3 m 1 f.

10. Tinam. [illegible] 1 ms. mit ascar. intest.

Dendrol. grandis [illegible] mit Taen. [illegible]

11. Picus. [illegible] 1 m 1 f. nichts

Sterna minuta

Plotus melanog. [illegible] Mag. & [illegible]

Dist. int.

Villa Maria 27 Septbr.

Cichla caranaca

Salmo Piranha pequena

Ascar. [illegible]

Salmo tesouras 2 nichts

28. Gymnotus Tauro 3 Stück

Pent. [illegible] ascar. [illegible]

[illegible] [illegible]

Salmo Pira cachorro vermelho nichts

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] mit [illegible]

30. Gaissara

Phalargus 7 Stück mit Taenien und 1 [illegible]

Tot. flavipes 1 m 1 f. Stück mit Taen. [illegible]

[illegible] 2 M nichts 2 f.

Arras [illegible] 4 Stück nicht

2 Stück [illegible] mit 1 breit Taenia

1.3. 3 anas moschata.

1. Mysteria am. 1 f.
3 amphist. int. 2 asc. vent. frey.

Dendroc. grandis 1 ms. 2 Taen int.
Oriolus americanus? Troupe a gorg. ansang.
2 ms. nichts
Oriol. d. größt. Moral. 1 Rundst. mit d. Nebenhaut.

4. Retiro — Myster. schwarz. 1 f. mit einer Monost. int.
3. anas speculary. nichts.
7. Sauru.
8. Crocodilus Sclerops — viele Rundst. im Magen
Lungen nicht untersucht —
monostom. Distom. — kleine & größte Echenoch.
Ascarid. int.
Gracula nuda nichts — 1 f.
Dendrocalapt. grandis 1 ms nichts
8. Canis Cobinho. de campo 1 f.
Ligula.
1 Filaria. 1 zwischen Haut & Fleisch —
3 Rundst. im Magen
— Bothriocaph.
1 größt. & kleine Ascarid. int.
1 Ech. aus d. Zwerchfell.

27. Ard. lineata. 1 m. 1 f. 8 Leg
mit Ligula zwischen Haut & Fleisch
Cerv. ~~me~~ rufus nichts. ms.
anas mosch. 1 m 3 f. nichts
Oriolus americanus 1 m nichts
Totanus vin glottis 1 f. Fragmente von Taen.

29. Picus rubricollis 1 f. Sperrgeist am Fleischgeist —
Trochilus 3 m 1 f.
Sypra aureola 1 m.

30/31. Co Vultur Papa 1 ms. mit Rundst. und 1 Distom. aus d. Darmb.
Falco nisp. 1 f. mit amphist.

Mus — Cururu 1 f. nichts —
Salmo. clupeoides 11 ß nichts

2. Nob. colub. nisp.
2 Taen int.
gelb asc. einzeln in größ. Haufen auf d. Darmb.

Vultur. urubu. 1 ms 3 sehr kleine Echinorh. frey
Dist. & amphist. wenig.
1 ms. 10 sehr kleine Dist. / größt. Dist. & Amphis. wenig)

25. Anas [illegible] 1 f. 11 Taenien ohne Kopf.
[illegible] 4 Dist. [illegible]
1 ms. 12 [illegible] Taenien ohne Kopf

Rana. [illegible] 1 ms mit
1 Rind [illegible] Kopf [illegible] Magen
[illegible] Kopf [illegible] ganz frey.

26. Felis uncia 1 ms [illegible]
27. 54 Echinorh. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
34. Thyraloid. [illegible]
[illegible] 2 [illegible]

27. [illegible] men
28. [illegible] 1 ms
29. Mus. [illegible]
30. Ardea Egretta 1 ms
[illegible] Magen 1
1 Taenia [illegible] Kopf [illegible]
Falco pictus 1 ms nichts
Platalea [illegible] argaja. 1 ms.

B 96
D 150
181.1

6. Dub. Rana. 99. 1 ms 3 f. mit
10 lang. Rindsch. aus } Rinde
6. dd. Monost. }
40. 12 sehr kurz. Rindsch. dibdar

8. Dub. = Rana. 99. 1 ms
lang. as. Rinde
kurz. dibd.

10. Rana n° 99. 2
6 lang. Rindsch. aus d. Darmkanal 1 m
Rindwürmer aus d. Magen. 1 ms

Colub. Jararaca. 1 ms
Dec 12 3 frag. mit Kopf von lang. Taenien und
[illegible] frag. ohne Kopf.

Sirena leukeurin. 1 ms. 1 f. jung. jedes mit 10
sehr klein. asc. aus d. Blinde.

14. Vultur. urub. 1 m. 2 Ech.
v — 1 ms nichts
1 f. mit 38 Amphistom.
1 ms. nichts
1 f. 3 Echinorh.
1 f. 1 Ech. 20 Dist. 33 Amphist.

Podi. domus ars sf.

9. acil ysf. Taen mit Lopf
2 oder Lop. / nu Lopf agatt
4 Lang Taen ohne Lapf.
4 Kinds Klaue

13 Felis ursus [illegible] Ech. Lopf. auch
Lamabey. — 2 [illegible] mit d. Lungen
1 W. nu Val. Lopf [illegible] Ech. ent.

15. Vult. urubu. — 1 ms. 2 Lingl Klauen ganz
Gest. Vd Vorangehen [illegible] 5 amphist.
18 5 amphist. 2 v Dart
16 10 amph. 2 v Dart ent Dart

Falco [illegible] 1 ms Lingl
Aquila [illegible] 1 ms Taen.
Ech Vultl. [illegible] ganz.
Aquila. [illegible]

Strolfes [illegible] mit d. ganz Lustopf
mit 1 Taen mit Lopf ent

17. Corvus nucifr [illegible]
Rhamphast. und Graculus 1 f. mit zwei Taen
Er hopft [illegible]
Cannus cayanus [illegible]
Psana mutica [illegible]

18. Vult. urubu. 1 ms. 6 Dart. 12 amphist
— + 1 f. 6 Dart. 19 amph.

19. Vultur urubu. — 1 ms. [illegible]
7 Dart.

19. — 20. Dart. 2 amphist.

1 f. 1 granul ysf. Lingl [illegible] ganz f. Tonic ag mus.
9 amphist.

[illegible] 1 Dart 2 Ech. ganz. im Darmf.
3 Lingl Klauen [illegible] Mag
1 [illegible] [illegible] im Leber mit Lungen und ganz ysf. Lopf
auf einem Bein [illegible] einem Lingmuskel ysf. Lopf
[illegible] mit d. ganz Tonic

20. anis [illegible] 1 ms. 24 Taen ohne Lapf
1 f. 1 Taen f.
1 f. [illegible]

[illegible] 1 Spec cut ag f. 1 lang Taen. Stiel
f. 1 lang Taen mit 2 Lingl

22. [illegible] 1 ms 1 Ligula aus
ganz Bauch d. Fleisch

23. Ardea [illegible] 2 Dartos. ganz ausf
1 Ech. Lopf 1 ass. 1 Dartos
Vorh. [illegible] Dart. d amph: ganz. 1 Monostom
[illegible] 1 Dart d amph. ganz.
[illegible] 1 Lingl Klauen mit d. Darmf
[illegible] mit d amphist ganz.
[illegible] amphist d. Dart. ganz.

7
6
3
6

cont. 200.000
200 000

13
3
160 | 6.

166
83 - 1/4 - 2 - 1/2

25
8
40
1. 20 V.
66 - 12
33
99 - 32

Ohtb. Trogon. vio la —
5. Lan. v. sp. — 1 m. sf.
Tap. am. fact. 1 f. —

6. Galb. v. sp. — 1 m. act. 1 m. sf. horn
angef. aus Landgi
1 ms mit. 24 Taen. mit Kugl aus v. Diunde
die beyd. blindsäure nichts
1 m. sf. nichts —
Nectarinia v. sp. nichts sf.
Spvia sf. —
Tanagra. Chlorotica sf. — —
Lanius — mit Chor.
Lanius sf. bl.

Phenops gemeinsam
1 ms —

7. f. trüb — 19°. dann Sonnblick — Mittag Aug 21° —
fer. Domus —
an d. Brazil. gebogen

8. f. 19°. hell mit Wolk — Mittg. 26° —

9. f. 19°. — Mittg. 26° —

950 Meil — von
Mtgs. bis Pará
bis Forte de Prim
199 3/4 Meile

10. f. 19°. hell mit Wolk
Mittg. 26° trüb —

11. f. 19°. hell mit Wolk
Mittg. 27°. hell mit Gewitterstr.
nichts hell —

12. f. 19°. hell mit
Mittg. 26° — hell mit sein Gewitterstr.



Thiere ohne Wirbelsäule
sie haben keine wahren Knochen
Körper ist weich größere
Fruchtbarkeit stärkere Reproduk-
tionskraft weil die Organisation
viel einfacher ist
2 Unter Ab. 5 Klass

1 Unt. diese Th. haben ein vollkom-
Herz durch Kiemen athmen
vollkommen Zirkulation der
Säfte

1. Mollusca Schleimthiere schleimigt
weichen Körper keine Glied-
massen. sie haben einen
platten Sauer auf den Bauch
worauf sie kriechen
sie haben unartikulirte Füsse
oder Hörner Dentacula die
sie zurückziehen und aufstecken
können. Mund aus einer schmalen
Öffnung bestehend bey denen
ohne Kopf an der Mitte des
Körpers. Bey den meisten
sind die Geschlechtstheile hermaphro-
[illegible] entweder

Die meisten haben ein steinartiges Gehäuse, dieses besteht aus 1 oder 2. od. aus mehreren Schalen oder der Körper ist nackt meistens Weltmeer auch süße Wasser

2 Ord. 1 die einen Kopf haben
1 f Mollusca cephala nuda
2 f — — conchiliopteris

1 Gatt der — cephalis nudis
Sepia Dintenfisch
— officinalis mittell M. weg des os sepia merkwürdig

2 g. Limax nackte Schnecken
nackten Körper schild auf dem Lauch muß dem

2 fa. mit steinartigen Gehäusen
haben nur eine Schale und haben Köpfe
1 g. Conus Kegelschnecke
70 Art in der See
Cyprea Porzelan Muschel
— tigris Tigermuschel
— moneta Geldmaschine M. 5120, 1 Kup.

Murex Stachelschnecke
— tritonis Tritonshorn
— Helix Eßschnecke
— spomacea Zeugnisse Eßschnecke
die Öffnung der Schnecken ist durch einen Deckel geschlossen der an dem Styl od. Fuß befestigt

Acephala
ohne Kopf acephala nuda
— conchilioptera

1 conchiliofera
1 g: Pinna Schinkenmuschel
Seidenmuschel
Pinna mobilis alle Seidenmuschel
Vitulus — Miesmuschel
— critophagus Steinbohrer
Perlmutter Muschel
Camma Kimmuschel
midas wolf
Venus Venus muschel
— edulis europäische Meere

Das Athmen geschieht durch Luft und Wasserkanälen.
Durch diese Stigmata

1 Klasse bilden die Insekten Entomologie haben artikulirte Gliedmassen auch solche Fühlhörner antennae, weichen sehr unter einander ab, die bedekung ist bald weich bald hart, bald mit flügeln bald ohne solche. sie kommen fast alle nicht vollkommen Insekt

1 Mundwerkzeuge bestehen aus ~~einer~~ 2 hornartigen äussern Kinnladen mandibulae
2 innern maxillae
ferner aus 2–6 Kreuzspitzen
oder sie bestehen aus einer Art von Saugrüssel lingua der sich zusammenrollen läßt
oder bestehen aus einem rostrum einer artikulirten hohlen rüssel der sich an die Brust anlegt wie bey den Wanzen
oder best: aus einer nicht nicht artikulirten zurükziehbaren Rüssel wie bey den fliegen proposcis

2. Augen, sind gewöhnlich 2 auf d. Kopf
einige 6-8 einfache außen sind
unbeweglich nackt, sind sehr zu-
sammengesetzt
3. Fühlhörner antennae sind 2. bisweilen
fehlen sie gehören zum Gefühl, das
Gehör scheint auch in diesen antennen
zu sitzen
Leman über die Sinne.
4
5
Füße sind 6. 8 bestehen aus eingelenkt.
Gliedern
6 Flügel - 2 - 4 sind häufig die obern
sind mittheils hart d. &c. einigen
fehlen sie ganz, bey den 2 flügelig
bemerkt man 2 kleine Stilchen
Schwingkölbchen
Die Insekten sind getrennte Geschlecht.
es giebt Geschlechtslose Individuen
sie gatten sich vollkommen
meisten legen Eyer wenige
gebähren lebendige.

Gestalt Anzahl der Eyer ist sehr verschieden
aus dem Ey kommen sich in Gestalt eines
Wurms Raupe Larve. der sich nicht
fortschlangt, stark frißt sich häutet
ungeflügelt, hernach verwandelt
er sich in ein Puppe Chrisalis
nach einer gewissen Periode von
einigen Monathen u. Jahre kommt
das Insekt aus seiner Zelle her-
vor. Aufenthalt ist sehr ausgebreitet
wenige leben gesellschaftl.
1000 art.
Aldrovand Jonston Ray Fabricius Sistem
Schranc Fauna insectorum Austriae
Schaeffer Regensburger. Jn. Roesel
Esper Swammerdam das Buch der Natur
Reaumur. ~~Toucroy~~ Geoffroy entomologia
parisiensis Leicharting Tizoler Jns

19. Scorpionen. keine Antennen
8 f. 8 Aug. lebendiggebährend.
— europaeus. Scorpionöl.
— afer. größte Art
— americanus.
29. Aranea 6-8 Aug. 8 Füß.
Spinnorgane 5 Wärzchen am After. Die Spinnwerkzeuge
keine antennae 300 Spinnen in Deutsch
— tierema.
— domestica.

avicularia. Buchspinne.

Milben accarus ohne Flügel
2 Aug. 8 f. meinen Saugrüssel
— scabiei sio Käseleuchtbe
— reduvius Zeck
Scolopendra platt gedrückten Körper
mehrere Augen sehr viele Füße
— morsitans. groß Ostind. Biß schädlich folgen
Vielfüß sehr viele Füße.
Pediculus Saugrüssel 2 Augen
6 Füß.
— humanus bey Menschen am Kopfe
— pubis sekenförmige Füße
Pullex 6 Springfü eingebochne Aug
geschlossen Körper artikulirten
Rüssel leidet wahre Verwandlung
— pentrans Sandfloh.
— irritans.

Scheidenflügler Coleoptera

2 große Augen 2 vielgliedrige
verschieden gestaltete Antennäe
Mund besteht aus Äußern und innern
Kinnbaken. 2 Lippen 4–6 mehrgliedrige
Freßspitz palpi.
haben 6 Füße
Larven halten sich meistens unter
der Erde auf

nos Arten um 2 Lippen. murinus
aeneus.
Lucanus
— cervus Hirschschröter Eichen.
Scarabaeus
— — hercules
— nasicornis
Melolontha Maykäfer
— auratus Goldkäfer

Dermestes Speckkäfer
— lardarius gemeinen Speck.
— pellio Larve den Kleidern schädl
Bostrichus Typographus.
— cipochrapus Borkenkäfer
Coccinella Marienkäfer
— septempunctata gemeinen Zähnweh.
Curculio Rüsselkäfer
— palmarum
Cerambix lange antenae Holzbok.
— moschatus
Lampiris Leuchtkäfer
der phosphorischen Schei.
— splendidula Jeonnes Kaf
Dilyscus.
Carabus Taufkäfer

2. Augen, sind gewöhnlich 2 auf d. Kopf
einige 6-8 einfache außen sind
unbeweglich nackt, sind sehr zu-
sammengesetzt
3. Fühlhörner antennae sind 2. bisweilen
fehlen sie gehören zum Gefühl, das
Gehör scheint auch in diesen antennen
zu sitzen
Leman über die Sinne.
4
5
Füße sind 6. 8 bestehen aus eingelenkt.
Gliedern
6 Flügel - 2 - 4 sind häufig die obern
sind mittheils hart d. &c. einigen
fehlen sie ganz, bey den 2 flügelig
bemerkt man 2 kleine Stilchen
Schwingkölbchen
Die Insekten sind getrennte Geschlecht.
es giebt Geschlechtslose Individuen
sie gatten sich vollkommen
meisten legen Eyer wenige
gebähren lebendige.

Gestalt Anzahl der Eyer ist sehr verschieden
aus dem Ey kommen sich in Gestalt eines
Wurms Raupe Larve. der sich nicht
fortpflanzt, stark frißt sich häuteb
ungeflügelt, hernach verwandelt
er sich in ein Puppe Chrisalis
nach einer gewissen Periode von
einigen Monathen od Jahre kommt
das Insekt aus seiner Zelle her-
vor. Aufenthalt ist sehr ausgebreitet
wenige leben gesellschaftl.
1000 art.
Aldrovand Jonston Ray Fabricius Sistem
Schranc Fauna insectorum Austriae
Schaeffer Regensburger. Jn. Roesel
Esper Swammerdam das Buch der Natur
Reaumur. ~~Toucroy~~ Geoffroy entomologia
parisiensis Leicharting Tizoler Jns

19. Scorpionen. keine Antennen
8 f. 8 Aug
— europaeus. lebendiggebährend.
— afer. größte Art Scorpionöl.
— americanus.
29. Aranea 6-8 Aug. 8 Füß.
Spinnwarzen 5 Wärzchen am After. die Spinnwerkzeuge
keine antennae 300 Spinnen in Deutsch
— tierema.
— domestica.

avicularia. Buchspinne.

Milben accarus ohne Flügel
2 Aug. 8 f. mit Saugrüssel
— scabiei sio Käselmilben
— reduvius Zeck
Scolopendra gekettgedrückten Körper
mehreren Augen sehr viele Füße
— morsitans. groß Ostind. Biß schädlich folgen
Vielfüß sehr viele Füße.
Pediculus Saugrüssel 2 Augen
6 Füß.
— humanus bey Menschen am Kopfe
— pubis sekenförmige Füße
Pulex 6 Springfi eingebochne Aug
geschnitten Körper artikulirten
Rüssel leidet wahre Verwandlung
— pentrans Sandfloh.
— irritans.

Scheidenflügler Coleoptera

2 große Augen 2 vielgliedrige
verschieden gestaltete Antennäe
Mund besteht aus äußern und innern
Kinnbaken. 2 Lippen 4–6 mehrgliedrige
Freßspitz palpi.
haben 6 Füße
Larven halten sich meistens unter
der Erde auf

nos Arten um 2 Lin. murinus aeneus.
Lucanus
— cervus Hirschschröter Eichen.
Scarabaeus
— — hercules
— nasicornis
Melolontha Maykäfer
— auratus Goldkäfer

Dermestes Speckkäfer
— lardarius gemeiner Speck.
— pellio Larve den Kleidern schädl
Bostrichus Typographus.
— cipochrapus Borkenkäfer
Coccinella Marienkäfer
— septempunctata gemeiner Zähnweh.
Curculio Rüsselkäfer
— palmarum
Cerambix lange antennae Holzbock
— moschatus
Lampiris Leuchtkäfer
der phosphorischen Schei.
— splendidula Jeonnes Kaf
Dityscus.
Carabus Taufkäfer

Tenebio molitor Mehlkäfer Mehlwurmkäfer

Meloe Maywürmer

— vesicatorius

3 Ord. 4 flüg. die obern lederartig häutig dienen den aunter zum Theil zur Scheide dienen

— Ortoptera Heuschreckenartige Thiere

Lippen 2 große Aug 3 kl. Neben augen

Forficula Ohrwurm

— auricularia

Blatta Schwabe

— orientalis Schwab.

— americana aus Amerika

Gryllus.

— — —

— — domestica

— campestris

— stridulus

— velociferus Säbelhäuschrecke

— myggratorius Zuckheuschrecke

Hemiptera Halbflügel

artikulirten Rüssel keine Freßspitzen keine Kinnladen

Fulgora Laterträge mit einer phosphoreszirenden Blase auf den Kopf.

— candin. Chinesischer Latern.

— europea europäisches

Cicada Springfieber

— spumaria mit den Weiden die

Cimex Wanzen

— lecturarius ungeflügelt Bettwanze

Aphis Blattlaus

Coccus Schildläuse

Männchen haben 2 aufstehende Flügel Weibchen unbeflügelt

— illicis Scharlachbeeren sind die Auswüchse wo die Eyer dieses Insekts auf der quercus sind coccifera.

— polonicus deutsche Cochenille am Weggrase

— cacti Scharlachwurm Cochenille mexicana wird kultivirt in Mex. und Spanien

— lacca. Gumilaus

Neuroptera

4 netzartige unbedeckte Flügel mit einer Kinnladen ohne Freßspitze ohne Rüssel

Livellen Wasserjungfer

6. Ord. fl Diptera 2flügler
schwingkölbchen einfachen Rüster
mit 2 Flügeln
larven ohne Füße

Pulex Gölse
— rectans hollopathher fliege Gölse

Tabanus Breme
— bovinus Viehbremse
— Conops Stechfliege
Conops calcitrans gemeine

Hyppoboscus Lausfliege
— aequina.

Oestrus Bremse
legen die Eyer in die Haut der
Thiere
— bovis — ovis - equi

Musca. fliege
— domestica

7 Ord Himeroptera Bienenartige Insekten
eine Art von Rüssel 4 Fresspitzen
geschlechtslosen und Weibchen haben
einen Stachel am Ende

Cineps Gallwespen
— quercusfolii bringt die Galläpfel
hervor legt ihr Eyer in die Blätter der Eiche
2 Ar. Quercus cerris ein anderes Insekt
bringt die Knappern hervor. beborth
— rosae. die Sammenkapsel.

Vespa Wespe
verfertigt künstliche Nesten insbesondere
aus Holz welches sie kauen und zusammen
setzen

Apis Gerichten Körper
— mellifica Honigbiene.

Formica Ameise
hinterleib hängt mit

Leptoptera Schmetterlinge
mit 4 geschuppten flügeln
einen hakten zusammengerollten
Rüssel der aus 2 Fäden besteht
2 Fühlhörner 2 große Aug 2 Neben
3 Fam. Abend. Tag. Nacht Schmetterlinge
Abendschmetterlinge
— Sphinges kurze halbprismatische
Fühlh: die in der Mitte dicker als
an beyden Seiten die flügel
legen sie horizontal
Kopf ekt wappe schunten der Erd

Papiliones nymph. phaleratus paphia
flige an Tage verpp. sich ohne Gespinst.
kolbenförmigte an der Spitze dickere
antennae aufgerichtete flügel
Raupen dornig stachlig.

Phalana
borstenförmige Antenne
fliegen bey nacht Raupen ganz behaart
spinnen sich ein und verwandlt sich im Gespinste.
atras bringt die wilde Seide
hervor

8 Kl. des Systems sind die Würme
vermes.

Langen Körper ohne Gliedmassen
durch Segmente abgetheilten Körper
sie haben kein Herz keinen voll-
kommenen Kreislauf, sie athmen
durch Luft od. Wasserkanäle
~~bey~~ einige wenige athmen durch
Kiemen
von den Insekten unterscheiden sie
sich durch den Mangel an Glieder-
massen. sie pflanzen sich durch
Eyer fort sind Hermaphrodite
theils getrennten Geschlechts
Reproduktionskraft ist sehr stark

Condur Vultur gryphus Linné
Le Condor
Condur

Beschreibung. In ~~Haw~~ Hawkesworth Reisen, wird von einem von diesen Vögeln Meldung gemacht, der im Fort Desire, der Pengnin Insel geschossen wurde, die Beschreibung folgt.

" Der Kopf dieses Vogels gleicht jenen eines Adlers, ausgenommen, daß er einen breiten Kamm auf denselben hat. ~~Der runde~~ Hals, hat eine weiße Krause (ruff) welche genau dem Halstuche ~~ei~~ (tippet eines Frauenzimmers gleichet; die Federn auf den Rücken so schwarz als schwarzer Agatstein (jet), und so glänzend, als die feinste Polirung (polish) dieses Mineral machen könnte. Die Schenkel, waren ~~so~~ außerordentlich stark und dik, und die Klauen gleich jenen eines Adlers, ausgenommen daß sie nicht so scharf waren: und die Flügel, wenn sie ausgespannt

Out of the general Synopsis of Birds

1. Land-Birds

Order 1. Rapacious.

Genus 1 Vulture.

N. 1 Condur

N 2 Crested

N 3 King

— 4 arabian

5. Carrion Aas

6. bearded bärtiger

7. Alpine

a ashcoloured

b. Egyptian

8 Cinereous

9 Maltese

10. black

11 Fulvous

12 Hare

13 Golden

14 Angola

15 Tawny gelblichbrauner.

16 Bengal

17 Secratary.

AS CORTES GERAES EXTRAORDINARIAS E CONSTITUINTES DA NAÇÃO PORTUGUEZA

Ao Povo do Brazil.

FUndar, e consolidar a Monarquia Constitucional em ambos os Hemisferios, he o constante objecto das Cortes, e o ardente desejo de todos os bons Portuguezes. Estreitar por vinculos indissoluveis a união de dous Povos irmãos, ainda que separados por um tão largo espaço, he o difficil problema, cuja resolução só póde obter-se por meio de uma convicção intima, e de uma declaração franca do que nos convem a todos. Não percamos por isso em vãs disputas, e em criminações reciprocas aquelle tempo, que nos he tão necessario para manter a integridade de um tão vasto Imperio, cuja grandeza, e cuja solidez depende de uma união bem ajustada, e permanente.

Brazileiros, nem os vossos irmãos da Europa vos contradizem, nem as Cortes vos negárão jámais o direito natural, que tinheis para vos constituirdes independentes, e para escolherdes as condições do Governo, que mais vos conviesse: virtualmente assim o reconhecêrão as Cortes, quando vos propozerão a Lei Fundamental das Bases para declarardes, se quizeis, debaixo daquellas condições, fazer comnosco a mesma consociação, e o mesmo Imperio. Se os vossos Representantes não podérão cooperar em razão da distancia, e do tempo, para se fazer esta Lei, vós a adoptastes depois de feita, vós a jurastes, e os votos de todas as Assembléas politicas do Brazil resoárão nas abobadas desta Casa no meio dos maiores applausos, e do maior enthusiasmo. Desde então ficou sendo notorio ao mundo inteiro, que bem longe de adoptardes uma submissão incondicional, havieis reconhecido, e jurado as Bases da Constituição da Monarquia Portugueza, e que debaixo do politico Systema, e das condições do Governo alli estabelecidas, havieis proclamado a união com Portugal pela maneira a mais solemne, e a mais espontanea.

Os principios essenciaes desta nossa originaria Carta Politica não forão alterados na Constituição; forão sim mais desenvolvidos, e mais explicados. Elles consistem geralmente na divisão dos poderes politicos — uma só Camara de Representantes com o poder de legislar — uma só Assembléa em cada anno — um só Rei inviolavel com Ministros responsaveis — a Liberdade da Imprensa — o Direito de Petição — Eis as primeiras garantias da liberdade politica, e civil do Povo de Portugal, e do Povo do Brazil; liberdade, ó Brazileiros, que he uma, e a mesma tanto para vós, como para os vossos irmãos da Europa; pois para todos tem o mesmo valor, e a mesma efficacia; nem a Constituição concede a uns o que nega a outros: quem vos diz o contrario quer só satisfazer paixões ambiciosas, alienando o vosso espirito para comprometter a vossa segurança, e para acarretar sobre vós os horrores da anarquia, e da guerra civil; são homens inquietos, que adulão toda a especie de poder só para subirem ao cume da authoridade, e das riquezas, sem lhes importarem estragos, e desolações. — Cesse pois de uma vez a illusão, que por acaso ainda obscurece alguns espiritos em boa fé.

Brazileiros, quando as Cortes vos mostrárão o pendão da liberdade, e vos convidárão para vos unirdes a elle, não foi certamente para vos reter no estado servil de uma dependencia colonial: quando vos offerecêrão a mesma Constituição, as mesmas liberdades, e as mesmas garantias, não

16 aug 1 Pentast 2 Rund h. aus d. Damenhaus
— Cara Cascudo 5 — Schlangenhaut [illegible]
Matrinch — 3 f — 1 Rund [illegible] auf [illegible]
Corovina — ms — 1 Rund auf [illegible]

17. aug Piranha Peito vermelho — 2 f —
— doce nichts

gefleckt Begre 1 f — 1 l. rothe Rund. 1 dik
kurz weiß — 1 schw. kurzer 1 Amphist

18. —
Gymnotus electricus 1 f.
6 ab 1 Pent. auf in 1 Kopfe.
Rund 2 f
4 lange Distomen aus d. Damenhaus

14 aug
Pin cachorro 14. roth Rundt 3 schw. kl. Rundt
69 Echinos 1 Dist 14 [illegible]
9 f. 5 ms

Acara bandeira 6. Amphist 1 Asc. [illegible]
Vacars. lineata 1 ms — 2 M. wie Echinos
Salma auriflama 22. M. 5 kl. Asc. [illegible]
Joan[illegible] Ehenza 1 f — 50
105 109 — Dist. 10 in d. Kopf
4 Rundt auf [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

20 —
Acara [illegible] 2 M. nichts
Loricaria lineata 1 f 3 ms 17 Ech
12 Dist. 8 Echinos [illegible] 4 — dann
Lor. [illegible] 2 f 2 ms — 25 —
1 f 4 Ech 1 ms 3 Ech 5. 10 [illegible]
[illegible] nichts 1 ms 2 Ech
11 12 15
Cara bona 17 [illegible] n° 75.
1 — 26. 26 — 1 Bot 13. 2
1 — 4 — 1 [illegible] 10 Bot
3 nichts 15 19. 23

Cara preto — 5 —
6 Asc — 5 Amphist

Dasyp[illegible]
Das. gilvp 1 ms
10 f. — Taer
mit Kopf.
5 f. ohne Kopf
2 Rund —

76
Cara cascud.
3 M. 1 [illegible] 2 d.
aus d. Damenhaus 1 Dist
[illegible] d. Rinn [illegible] in einer Kap

Bandeira 8 Stub
7 Asc 1 [illegible]

absoluto, e aos privilegios da aristocracia; porém as Cortes vos offerecem a Monarquia Constitucional, como um meio termo entre estes dous perigosos extremos, como a taboa da vossa salvação politica; vós a tendes da sua mão, e escusais entregar-vos ao operoso, e arriscado negocio de estabelecer um Governo absolutamente novo. Os vossos Representantes cooperão com actividade, e sabedoria para se fazerem na Constituição aquellas addições, que forem compativeis com a unidade do poder, e do Imperio, e que tiverem por fim immediato a geral utilidade dos Povos. Não vos faltará nem a mais absoluta independencia no exercicio do poder judicial; tribunaes incommodamente situados negão justiça. Não vos faltará tambem uma authoridade delegada do Rei, que na repartição dos empregos, e das mercês ponha mais ao vosso alcance a intervenção do poder Real.

Brazileiros, o acto de adoptar, ou de rejeitar um Systema de Governo he hum compromisso; pezamos inconvenientes; damos, e tomamos; entregamos uns direitos para melhor podermos gozar outros; e assim como sacrificamos a liberdade natural para gozarmos na associação civil com mais segurança as suas vantagens, assim devemos sacrificar uma parte das vantagens civis á superior utilidade da união de um grande Imperio. Se os mares se agitão, se os mezes passão, e se mil e quinhentas legoas de Oceano põem o espaço, e o tempo entre a Lei, e a sua execução, não he tão circumscripta a esfera dos inventos humanos, para que a sabedoria das instituições não possa reunir o que a natureza separou; e se ainda assim mesmo restarem alguns inconvenientes, bem compensados ficão evitando-se os horrores da anarquia, e as vexações do poder absoluto. Tudo isto foi bem calculado por vós na vossa escolha, e no vosso juramento.

Eia pois, Brazileiros, não quebranteis promessas tão solemnes, e tão justas. Exercitai o vosso poder politico, mandando sabios Representantes ás Cortes da Nação; não será grande o seu incommodo, se o comparardes com a importancia da união: gozai das franquezas da liberdade; a protecção do Governo vos assegura todas as vantagens sociaes.

As Cortes não pertendem sustentar a união de Portugal com o Brazil pelo meio das armas; a força he fraco instrumento para conter n'uma connexão subordinada, e proveitosa um Povo activo, numeroso, crescente, e amigo da sua liberdade. A nossa união, Brazileiros, depende só das affeições, e do interesse, que produzem vantagens reciprocas, nomes communs, parentes; amigos, leis iguaes, igual protecção. O titulo dos vossos direitos he a Constituição. Brevemente ella vos será remettida com as necessarias addições; tanto basta para que ninguem ouse jámais persuadir-vos a delirante extravagancia de que vos pertende reduzir a colonos, e a escravos quem assim vos deseja constituir: e se uma declaração tão singela, e tão franca não he capaz de remover todas as causas da discordia, e de restabelecer a primeira, e não suspeitosa confiança, as Cortes, lamentando a vossa cegueira, e a vossa allucinação, ficão ao menos satisfeitas com ter dado a paz á sua consciencia, declarando os seus principios, e manifestando os seus sentimentos. Paço das Cortes em 17 de Agosto de 1822.

Agostinho José Freire, Presidente.
Francisco Xavier Soares de Andrade, Deputado Secretario.
João Baptista Felgueiras, Deputado Secretario.

Na Imprensa Nacional.

foi certamente para vos fazer escravos. Estranho modo de colonizar, e de escravizar os Povos fora este de lhes reconhecer direitos, de que estavão despojados, e fóros, de que jámais plenamente gozárão. Como se a liberdade civil, e politica fosse alguma especulação abstracta, e fóra do alcance de qualquer mediana capacidade, tem querido persuadir-vos uma seita de desorganizadores, que era inconsistente com aquella liberdade ficarem subsistindo as Juntas Provinciaes, que são da eleição popular, e que vós mesmos tinheis creado; extinguirem-se os tribunaes, cuja inutilidade, e cujo pezo era notorio a todo o mundo; retirar-se da America o Herdeiro da Côroa, quando todas as razões politicas o chamavão para o pé do Throno, e quando vós mesmos tinheis manifestado a vontade de lhe não obedecer. Esta facção de ambiciosos, e de inimigos da tranquillidade publica, fez engrossar no Sul tão futeis pretextos: allegárão primeiro, que as Cortes não tinhão authoridade de legislar para o Brazil: allegárão mais a injustiça da legislação; e por fim declarárão a desobediencia formal, e a revolta manifesta; quando a authoridade legislativa das Cortes estava radicada nas Bases, e na vontade dos Povos, que adoptárão, jurárão, e reconhecêrão aquella authoridade, quando a justiça da legislação se firmava, ou na natureza das cousas, ou na vontade dos mesmos Povos anterior, e sufficientemente declarada; quando em fim a resistencia parcial era o mesmo crime da rebellião, que he sempre o precursor da anarquia, e punivel em toda, e qualquer associação bem organizada.

As Cortes, sabendo que esta revolta era apenas levantada por uns poucos de individuos, que assignárão um documento, decretárão o processo destes revoltosos. As Cortes respeitão a vontade geral de todo o Brazil, e sabem que a opinião geral dos Povos he o vehiculo, e o orgão de toda a legislação prudente; mas sabem tambem que a opinião geral de todo o Brazil he adoptar com as mesmas condições o mesmo Systema de Governo, unindo-se em perpetuo vinculo com Portugal, e sabem que as tentativas desorganizadoras da resistencia parcial são apenas ramificações da facção do Sul. Para conter o desenvolvimento destas, e de outras paixões inquietas, liberticidas, e contrarias á opinião geral dos Povos do Brazil, determinárão as Cortes que o Governo fosse authorizado a mandar Tropas para aquelle Continente. Novo pretexto para os facciosos! ... mas tão futil como os primeiros. Este meio, nos termos, em que as Cortes o adoptárão (qual de vós o não vê, ó Brazileiros?), se he efficaz para rebater parcialidades perigosas, he certamente inadequado para fazer conquistas, e para sustentar tyrannias; isto só bastava até para lhe tirar as apparencias de hostilidade. Porém as Cortes considerárão de mais a mais o gráo, a que tem chegado no Brazil a preoccupação entre Europeos, e Indigenas, e quanto erão de recear os excessos de um frenesi popular, que a Tropa do Paiz não seria capaz de conter: foi então necessario proteger a propriedade real, e pessoal de um grande numero de Cidadãos. E como podia ser indifferente uma tão grande massa de interesses, e de opiniões!.... Nada mais influio nesta determinação das Cortes.

Brazileiros, o procedimento das Cortes, e do Governo, cuja authoridade vós reconhecestes, e jurastes, não tem desprezado nem os principios da justiça universal, nem as maximas da arte de governar nas Leis, e nas Ordens, que vos tem mandado. Não vos entregueis por tanto aos caprichos de um partido, que vos persuade o contrario, porque só intenta dilacerar-vos, e desunir-vos. Reflecti vós mesmos; pensai no que ereis, e na graduação politica, a que vos eleva a Constituição; ponderai attentamente o que vos dizem esses violadores dos juramentos mais solemnes, e achareis que uns querem o extremo da liberdade, proclamando uma independencia democratica; outros querem o extremo da servidão, abrindo o caminho ao poder

Jede Klsse des Thrchs zerfällt in verschiedene Abtheilungen Zähne Extremitt. sind die Characteres der Unterabthl.

Extr. sind jene Werkzeuge, womit sich die Thiere ihre Nahrung verschaffen. die Zähne sind die Werkz. der ersten Assimilation der Nahrungsstoffe

Viele Sythr. haben freyze bewegliche Zehen deutliche oder Finger mit Nägel od. Krallen ~~verschiedene~~ an ihren Extr.

Bey andern bilden die Zehen Hufe ungulae.

Bey andern sind die Zhe so mit Ht und Flsch verwachsen, daß sie weder beweglich noch ~~sichtbar~~ unterscheidbar sind Flossfüsse pedes piniformes

3 Zahl

1 Cum extremitatibus digitatis
Dactylopoda Zehenfüsser

2 Säugethi mit Hufen
Oplepoda Klauenfüsser

3 Erepopoda Flossfüsser

7. Verschiedenheit unt. d. Zehenfüß.
einige haben ein Klaue sowol an byd. Extr.
als nur an den hinter od. vord.
7 Ord.
1. Zehenfüßer mit Händ an den Vord. Extr.
Zweyhänd. Bimana
2 Vierhänder Quadrumana an allen
4 Extr. ein Daumen.
3 Handfüß. Pedimana an den
hint. Extremit. nur einen Daum.
4 Zehenfüß mit Flügelfüßer
Flügelfüßer Chiroptera Handflügler
5 Ohne Daume ohne Flughaut alle Art.
von Zähnen Ferae Raubthier
6. Springfüß Petauropoda u. Glires
mit hinter Ext. welche lang sind
ohne Eckzähne
7 Faulthiere Bradipoda
mit lange ~~Klaue~~ die Zehen verwachsen
Erste 5 Ord. enthält Ihr die alle Art
v. Zähne haben, diese letzten
Schlüsse sind die oder die andern
Die Zerfahl. in 2 Unterabtheilung
1 mit aller Art Zähne
2 mit mangelhaft. Zähne

Klauenfüßer Oplepoda zerfahl
in 3 Ord.
Klauenfüß mit 1 Haupt Solidungula
Einhäufer
2 Klafüß mit 2 Kl. Bisulca Zweyhufer
sonst hieß sie Pecora
3 Klafüß. mit mehr Klaue od. Aftern
Klauen Pseudungula.
diese Theil Multungula Vielfuß
Flossfüßer zerfahl in 2 Ord.
Cretropoda
1 einige haben 4 Floß Empetra
2 einige haben eine 2 f weil
die hint. mit den Schwanz verwachsen
sind Cetacea.
Estones historia animal Aldravand,
Rayus Sinopsis Linné. Buffon 3 Verk. von
Pennant Pallas Schreber
Dactylopoda Zehenfüßer
mit freyen unverbund. Zehen mit Kratt
oder Nägel alle Art von Zähne
Bimana. mit Daumen an den Vord. Ext.
1 Gatt. Homo der Mensch ist dem
einzig in dies. Ord.

Die Größte Vorzüge des Mensch ist
der Geist er hat den vollkomsten
Körperbau verträgt alle Klima.

Es giebt nur ein eigig Mensch Species
Linne hat 5 Racen angenommen
Blumenbach hat ein eignes Buch über die
Menschen Racen geschrieben.

1 Der Kaukasisch Race weiße farb
Bewohn der nördlich alten Welt Europa
~~Nord~~ Asien nördlich Africa

2 Race Mogolisch gelbe farbe
spranz. Haar
Chinesen südlich Asien östliches Europ.
Lappen

3 Aeti Schwarz farb kraus Haar
stumpfe Nase Africa

4 Americani rothbraun
American Esquerrain ausgenom.

5 Malayische braun kraus Haar
Malayen pmarianen philippinen
Südsee Bewohner.

Kaukasische Racen wird für die
Stammrace gehalt

Der Sitz der Schwarz farb ist in
der Malpigischen Schleimhaut
es gehört als eine angebohrne Dispositio
dazu

Die Länge des Kö. ist d. b. für
nördliche M. kleiner südliche
Größer

Chinesen Kegelförmig Schädl. Türke
Kürbisähnlichen durch den schwern Tribu
Etc

Lapp starke Gesichtskuchen Neger hervorragend
Kinnladen
Neger hat alle Schädlknochen stärker dichter
Neger kleinere Augenlöcher
besonders die untere Kinnlad kann ist
mehr noch einwärts vorderextrem
sind meiste um ein Zoll länger als
bey Europ.

274 Tage braucht der Mensch zur Ausbild
ehe er geboren wird überschritt
ist wird sie sehr selten

~~[illegible]~~ 2 Jahr braucht er in der
6-7 Jahr Stelle die Milzzähne aus Zähne zu bekommen
Mensch scheint zum gemischt Nahrung bestimmt
zu seyn
Urib ist schwächer ohne Bart
Wahre Hermaphroditus giebt es nicht beym
Menschen es sind Monstrositäten.

Quadrumana Vierhänder
Alle Art von Zähnen an alle 4 Extr. eine
abgesondert Raum die Hint. Extr.
sind bloß handähnliche Füße
die innere Fläche der Hände ist
kahl fing. stumpf mit einem wahren
Nagel bedeckt bey einige sind schon
zusammengedrückt eine Kralle bildend
Ähnlichkeiten sind den Mensch. Augenhöhle
durch [illegible] kleiner Seidenwand getrennt
Kinlad nicht die hervorragende Nase
mehr gewölbt Ohren nackt
2 Brüst an d Brust bey einige
keine Spur eines Schwanz und
die befestig des penis bey einigen
Menstruationen

Decas Collectionis suae cranionum
Campen ~~[illegible]~~ zeigte aus der Zerglieder
verschiedene Arangutung, statt der
Gilddrüsen haben sie ganz Säcke
an dem Larix
die mit der Luftröhre communicirt
und ~~[illegible]~~ jede Articulation der
Stimme sich verfügt. Eben deswegen
wollt einig beweisen daß der Mensch
ursprünglich keine Stimme hatten, weil
jene Mensch. die Kröpfe haben, welches
nur Aufblasen Monstrositat der Gilddrüse
ist, sehr schwer reden, und die
sprachlosen Cretins allzeit Kröpfe haben
Man theilt sie in 2 Familien die
Vierhänder.
1 Fam. die gleichen Mensch 4 Nord. zäh in jede
Kinlade haben diese sind die menschen
ähnlichsten.
2 f. Makiartig 4 Nord. zäh in der
ober. 6 oder weniger Wurzähne in
der unter wenn sie auch 4 haben
so sind sie doch in der Lage ver-
schieden.

3 Cynocephalus Hundsaffe zwisch 50-30°
Bakentasche Kahles Gesäß Afrika
Affen,
— mona weiße
— diana weiß Cent Guinea
— sabaea grüne Affe Senegal
— cynomolgus gemei. Hundsaffe
4 Gatt Papio Paviane
45-30° bak. kahles Gesäß kurz
oder keinen Schwanz
— maimon Mandril 3-4 5½ Fuß
Guinea Nase und seitenfläche und
Gesäß ist in den Jugend blau
gefärbt im alter roth.
Makiartige Affen
5 Gatt.
1 Lemur Maki
4 Vor. in der obe 6 in der unter
Kinlade Lebensart Gestalt wie
die andern Affen weit mehr
verlängerte Schnauze Bäume
— macaco vari. Halskrag.
— mongoz Mongus Grau
— catta Mococco weiß und schwarz geri
ungelten Schwanz
2 Ord. Chiroptera Flügelfüßer
der Ganze Körper von den Vord.
Extremitäten ~~bis~~ den Schwanz
mit gerechnet und einer Flughaut
umgeben 2 Brustzitze meist
4 Vord. zähne.

30 Art. sind bis jetzt bekannt.
Gebiß ist sehr verschieden bey den Fledermäusen
Ohren sehr weit. die meisten haben
einen Schwanz [illegible] ganzen Erdbau
sind die Fledermäuse verbreitet.
Bäume Höhlen im Felsen alten
Gebäuden Häusern. Insekt allen
Art die des Nachts fliegen Geb
fleisch. in kälteren Gegend bringen
zu den Winter im Schlafe zu
Sie müssen höher seine Fallmach
ehe sie fliegen können Stimme
ist zischend Morogamie 1 ♂ höchst
2 Jünge
19. Teroceus fliegt Hund ohne Schwanz
4 Vordzähne im Ind. Kinlade
— vampyrus hat falsch diesen Nahmen
denn er saugt kein Blut Ostindien
Ast 6 Fuß der Flügel durchmesser
29. Vespertilio 2 od 4 in der ob
6 ausgezackt in
— auritus Langohr der unter
— murinus gemeine Kinlade
— bipistrellus
— Rinolphus 2 od 4 in der
ob oder unter
— ferrum equinum
Nase blatt förmig wie Hufeisen
— Philostomma Blattnase
2 od 4 Vord
auf aufrecht stehendes Horn an
der Nase aufrecht mit verschiedenen

gestalten

– spectrum Blutsauger.
Trichterförmig Nase sey aus
dem Eichhorn Südamerika

4 Ord. Raubthiere Ferae.
einfache Füße ohne Daum meistens
fleischfressend haben meistens 6 Vordzähne
in beyden Kinladen selten aber 6
mit 8: seltner 8 ob 8 unten
hat gewöhnl. einzelne Eckzähne die
mehr gekrümmt stark und zugespitzt
Mahlzähne mit spitzigen Kronen oder
mit zackigen Einige tritt. auf d.
Ferse auf andere auf den Zehen
digitograda Plantigrada.

Plantigradi meist einzeln lebend
solitaria nocturna des Tags meist
verborgen im Winte meist schlafend
1 G. Erinaceus Igel 6 ungleiche an Größe Vordzähne
in jeder Kinlade, Körper mit Stachel
besetzt corpus spinosum nach Willkühr
bewegbar 2 Arten
– europaeus rundlichte Ohren ausgekerbte
Nasenlöcher im Winte in hohlen
Bäumen.
2 G. Sorex Spitzmaus 6 Vord in jeder Kinlad
an Größe Ungleich mit Haar bedeckt
– araneus.
– fodiens Wasserspitz

Pterophtochus albicollis Kittlitz

chili

~~[illegible]~~ Wagen

Ob l. + Flügel & Schwanz rostbraun

ein Streich über d. Augen Unterleib

rostbräunlich weiß.

Oberbrust und übrige Unterleib

schwarzbraun geschwebert

d. Grundfarb. des Bauches & Afterpfeil

nach ins Hell rostbraun übergehend

scheint im Wien. Museum zu

stehen

1788

Anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesu Christo de mil sette
centos oitenta e oito annos em diante

Azara. p. 32. n° IV.

Caracara – Falco brasiliensis Li. –

Chimango und Caracaraguazu – der Brasilianer –

Azara p. 37. n° VI.

Chimachima – espece nouvelle – F. crotophagus M.B.

ist d. Caracara d. Brasilianer –

– Azaras n° V. Chimango – scheint der junge Vogel des Chimachima –

– p. 41. n° VII.

L'aigle couronnée – Calquin des Molina soll nicht verwechselt werden mit F. harpya des Linné

mein Falco 443 –

p. 43. n° VIII.

L'aigle noiratre et blanc – esp. n.

mein n°.

p. 44 n° IX.

l'aigle brun – esp. no.

p. 47. n° X.

l'aigle à queue blanche –

mein Falco n° 328. F. Curacuturu –

F. urubitinga Li. scheint meiner schwarzen Varietät

p. 50. n° XI.

La buse de Savanne noyées rousse – esp. nouv.

mein Falco n° 6. Gavicão pardo

an Falco aequinoctialis – Lath.

p° 51. n° 12.
La buse de savanne noyées, à taches longues.
vielleicht n° 334. mein Vogel

p° 53. n° 13.
La buse de savannes noyées a tête blanche
welche vielleicht Falco busarellus Lath. etwa
d. alte d. Vorhergehenden

n° 54. n° 14.
La buse des savannes noyées d'un rougeatre foncée
Falco Buzon Latham. n° 471. meines
Katalogs. Gaviaõ dos Mangues.

p° 55. n° 15.
Le ~~Mag~~ Macagua. n. es. sieht einen
Eule ähnlich

p. 57. n° 16.
La buse sociable. ist. mein Falco n° 243.
mit so dünnem Klauen ähnlichem Schnabel.

p 60. n°. 17.
La buse mixte à longues taches. n. es.

p 63. n° 19.
La Buse mixte, roiratre e rousse.
as. Accipiter guyanensis major. Sonnini.

p. 64. n° 20.
La Buse mixte noire – esp. n

p 65. n° 21 la Buse mixte brune. esp. nouv.

p 67. n° 22.
La Buse mixte couleur de plomb. nouv. esp

p. 70. n° 23. bis
L'Epervier patta.
Falco ornatus. Lath: l'autour huppe Le Vaill –
mein Falco 384. Napacanim. (branco)

p 74 n° 24 –
L'Epervier brun & moucheté
(Variété du faucon comun F. communis Sonin

p 75 n° 25 –
L'Epervier brun à sourcils blancs –

p 77. n° 26 –
L'Epervier bleuatre – Falco rufiventris –
vielleicht mein F. magnirostris).

p 78. n° 27.
L'Epervier proprement dit – F. nisus

p 79. n° 28 –
L'Epervier noir & blanc – vielleicht mein
oder noch bess. n° 236.) (Falco 395 –

p 80 n° 29.
l'Epervier rayé –

p 81. n° 33.
L'Indagé – n. es.

Umfang des Halses hint. d. Ohren 1 Sch.
— d. vor d. Vordfuß. 1 Sch 4 1/2 Zoll
Umf. hint. d. Vordfuß 2 Sch. 2 3/4 Zoll
— vor d. Hintfuß 2 Sch. 1 Zll
— d. Mitt d. Bauches 2 Sch 5 1/2 Zoll

Lacerta ein algira. aus d. Magen des Curucutum
Ob. Leib braungrau mit grünem Schiller, d. Schwanz
samt Ob. Seit d. Füße hell braun mit kupfer. Schiller.
Unt. Leib weiß mit grünlich Anflug. Unt. Seit
d. Schwanz rothlich sammelfarb. an d. Seiten des
Körpers schmales ein licht kupferfarbnes langes Streifelchen

Campo campredo d. 2/3 Oktb 820
Tanagr. mit Loxcartig Schnabel,
Iris carminroth.
Ob. Schwanz
unt. blaugrau.
Füße blaugrau.
Länge 9 1/4 Zoll Breite 10 1/4 d. Sch regt 2 Z. 2 Li

17 Nov 820

Länge ganz 6 Sch. 5 Zoll,
Schwanz 3 3/4 Zoll.
Höhe d. Vord.rüst. 3 Sch
— d. Hinter. 3 Sch. 5 Zoll
Umf. d. Hals. hint. d. Ohren 2 Sch. 4
— — an d. Schulter 3 Sch.
— d. Körp. hint. d. Vordf. 4 Sch. 4 1/2 Zoll
— vor d. Hinterf. 4 Sch. 6. Zol
Länge d. Rüssels, von d. Ob. Einlade.
3 1/2 Zoll
Umfang hint. d. Nasenlochs 8 Zoll
Nase licht aschgrau
Iris dunkelgrau, um das Schloch dunkel braun. haselnu
Schloch klein rund

— 17. Aug.
Sus tajassu — mas alt
Iris.
Länge. 3 Sch. 1 Zoll

Ytarare 26. Aug 12. 10
4
1 1
22 6
4
1 14
2 2
6

Veado branco mas.

Länge 3 Sch. 10 1/2 Z Schwanz 4 Zoll
Höhe von d. Mitt. d. Schultern 2 Sch. 2 Zoll
— am Hinterrüst. 2 Sch. 6 3/4 Zoll
Umfang d. Halses in d. Mitt. 13 Zoll

— 27.

Lacerta. in campo —
Iris bloß gelbl. silberfarben mit vielen feinen schwarzen Pinkten. um das runde Schloch ein haarfeines Ringchen von obig bloß gelbl. silberfarben

d. 30. 1 August

Veado branco. foem.

Iris.

Länge ganz. 3 Sch. 9 1/2 Z Schwanz. 3 1/2 Zoll
Höhe von d. Mitt. d. Schultern 2 Sch. 3 Zoll
— am Hinterrüst 2 Sch. 7 1/4
Umfang d. Halses hinl. d. Ohren 9 Zoll
— von d. Vorderfüße 1 Sch. 3 Zol
Umf. hinl. d. Vordf. 2 Sch. 1 Zoll
— von d. Hinterf. 2 Sch.
mitt d. Bauches 2 Sch. 5 Z

mas.

Länge ganz. 4 Sch. 5 Zoll Schwanz 5 1/4 Zll
Höhe von d. Mitt d. Schultern 2 1/2 Schuh
— am Hinterrüst 2 Sch. 8 3/4 Zoll

Tanagra violacea – Gatturama
nectarinia cyanea – (Certhia cyanea) schöne Freyreiß
in d. Nähe von Praya grande – scheint
~~Dir~~
Tanagra brasilia – Tijé –
cuculus cayanus – Tingazu
Trochilus sapphirinus – blau mit roth. Schnabel –
— ornatus – mit rostroth. Haube.
Crotophaga ani
Lanius Pitangua – Bentavi
(Sylvia), Rostrothe Rohrsänger. mit zugespitzt. Schnau
L'Inondé. Azara III p 461 –
Pitt. coronatus – coronat. Li ist in Guiana rothstirnig: Papa Perroquet
Dufresne le Vaillant – Camutanga. Schaüá
Pittacus Macavuana
— Guianensis } Maracana –
Procnias nudicollis – – Araponga –
Vanellus cayennensis –
Parra Jacana Li – Piasocca –
Oriolus violaceus – mit Vieh – ? Virabosta grande
Larus – der Lar. ridibundus ähnlich mit aschgrauen
Kopfe roth. Schnabel und Füßen
Vultur aura Linné – Alabiray d'Azara –
Ramphastos dicolorus – – brennend orangefarb. Kehle
Crotophaga major – groß. Annu
Turdus rufiventris. Berl. Sabiah (de Larangeiras)

Trochilus bicolor. Sapphir emeraude blauscheitlicher Fliegenvogel – ein diesem ähnlicher neu seyn sollender Vogel vom Neuwied bes.

p 64. Trochilus pileatus – 4 Zoll 8 Li. Par. M. lang Körp. prachtvoll glänzend grün, Scheitel, Gabelförmiger Schwanz Schwung und groß Flügeldeckfedern dunkelblau – After weiß – Schnabel gerade –

67. sagt er es gäbe Lar. marinus – Sterna caspia Hirundo, und eine d. St minuta ähnliche Art als St. argentea 9 Zoll 1 Li Schnabel & Fläß. gelb, d. erstere mit einer Schwarzen Spitze, Stirne und alle untern Theile d. Vogels weiß, Scheitel & Nacken schwarz, Rücken Flügel und Schwanz nett silbergrau.

– Penelope Marail – Jacupemba –

Rhamphastos Aracari, Arassari –

Trogon viridis – gelbbläuchig grün blau, und gelbe Turucua

– Picus flavescens. Specht mit blaßgelb Haube

– Charpentier à huppe étcon rouge d'Asa –

– Picus lineatus

72. Psittacus cruentatus n. sp. Tiriba 8 Zll 11 Li – Keilförmig verlängert. Schwanz – Gefied grün Scheitel und Hinterkopf graubraun – Backen und Kinn grün – Zwischen Auge und Ohr bräunlich roth – hinter d. Ohr an d. Seit d. Halses ein

orangegelblicher Fleck; und Uropygium ein d. Verl. Mus.

– Pavo – Pie à gorge

p 75. Hirundo collaris deutscher Cypselus. überall mit grünen Hals liegt ein weiß haben Stachelschäfte, lang hervortretten – Zehen sehr stark zu bogenform. Nägel an d. Felsen recht ge

– graubrauner Tölpel –

– Cuculus tenebrosus.

Falco furcatus –

104. Falco plumbeus auf d. sich mit kühnem Bäume stürzt –

Haemotopus –

104 Strix ferruginea rostroth, auf den Sc einige blaßgelb. od. am Unterhals ein Schwanz ungefleckt ro hellgelbröthlich und weiß Langsstrichen, Iris

orangegelblicher Fleck; Vorderhals himmelblau, am Bauch und Uropygium ein blutrother Fleck – Is. erythrogaster d. Berl. Mus.

– Favò – Pie à gorge ensanglantée ac –

p 75. Hirundo collaris n. sp. – von d. Größe unsers deutschen Cypselus. Ihr Gefdr ist bräunlich schwarz überall mit grünen Giller, und um den Hals liegt ein weißlicher Ring. Die Schwanzfeder haben Stachelschäfte, deren Spitzen eine Linie lang hervortritten – d. Ferse unbefdrt, die Zehen sehr stark zusammengedrückt, mit scharfen bogenförmigen Nägeln versehen, welche zum Anhalten an d. Felsen recht geeignet sind.

– graubraune Tölpel – vielleicht Pelec. parvus,

– Cuculus tenebrosus. schwarzer Kukuk

Falco furcatus –

104. Falco plumbeus auf d. höchsten Dürren Zweige d. sich mit kühnem schnellen Fluge auf die erschöpfte Beute stürzt –

Haemotopus – am Strand – p 105 –

104 Strix ferruginea n. sp. Caburé – 6 Zl 7 L lang rostroth, auf den Scapulae und großen Flügeldeckfedern einige blaßgelb. od. weißliche ~~Federn~~ Flecken am Unterhals ein großer weißer Fleck Schwanz ungefleckt rostroth; untere Theile des Leibes hellgelbröthlich und weißgemischt, mit rostbraunen Längsstreifen, Iris hochgelb – scheint verwandt mit azarão Caburé

Turdus orpheus – Sabiah da praya –

110 Curucau rasé d'Azar. Vol IV. p 222. Ibis mit den nackten fleischroth. gesicht –

110. Falco palustris – 19 zoll 8 Li lang – lang ein gelblich weiß und schwarzbraun gemischter Eulenkranz faßt d. Kopf ein; über den Auge hin ein weißlicher Streif; untere theile blaß gelbröthlich, mit schwarzbraunen Längsstrichen Unterhals schwarzbraun: Schenkel und Steiß rostroth Alle obern theile schwarzbraun; Schwing & Schwanzfedern Aschblau, mit schwarzbraunen Querbändern

Platalea ajaja –

111 Falco busarellus, mit rostrothem Körper, und gelblichweißem Kopfe.

112. Anas viduata.

– Ipecutiri d'Az. V. IV. p 345 – pfeifende grünschultrige Art Ente – (Mareca) –

113. Falco brasiliensis – Caracara –

116. Perdiza – Tinamus maculosus Temminck (scheint die Codorniz zu seyn)

124. Cuculus. Guira – Ame branco – Piririgua des Azara

Ardea nycticorax gleicht d. europäischen

Crax alector | mutum

Penelope leucoptera – Sacutinga

150. Cassicus haemorhous – Guache –

152. Alcedo alcyon – schön bläulichter Eisvogel soll d. große Eisvogel seyn –

151. Garb. dem Carbo cormoranus ähnlich

160. Tinamus noctivagus. n. sp. Juó
kleiner als die Macuca (Tinamus brasiliensis) Latt. 13 Zoll 5 L. lang. Ob. Theil dunkelröthlich ~~grau~~ braun Rücken etwas kastanienbraun: Zeitl. stark aschblau überlaufen etwas schwärzlich gefleckt – Unterrücken und Uropygium röthlichrostbraun aber alle diese Theile ~~mit~~ des Rückens sind schwarzbraun quer gestreift; Kinn und Kehle weißlich Unterhals aschgrau, Brust lebhaft bräunlich rostgelb. Bauch blässer gefärbt

163. Anas moschata.

163. Ardea pileata Lath. Garza real. mit gelblichweißen Körper und schön blauen Schnabel Le Heron blanc à calotte noire

163. Picus melanopterus. das ganze Gefieder weiß – flügel Rücken ein Theil d. Schwanzes sind schwarz, und das Auge ist von einem nackten Orangegelben Haut umgeben –

168. Procnias melanocephalus. – der Kopf dunkelschwarz mit einem Auge, dessen Iris zinnoberroth gefärbt ist – alle ob. Theile zeisiggrün, die untern gelblichgrün, mit dunklern ~~Quer~~linien.
9. Zoll 7 Li lang

175. Psittacus menstruus. Maitaca

178. Picus robustus - Berl: - Charpent. à huppe et cou rouges d'Az. vol. IV. p 6 -

187. Nectarinia cyanea, / Certh. cyanea Lin. bay Espirito santo.

—. Pipra parcola (v. caudata ajulis) -

— erythrocephala / nigra - vertice arcuillisque fulvis)

— leucocilla - / atra, pileo albo) -

187. Pipra strigilata n. sp - Ganz schwarz. Ob. bey olinda - Unterleiby varirlich, röthlichbraun gestreift

187. Tanagra elegans. n. sp. - mit schwarzem Schnabel, Kopf prächtig gelbgrünen Kehle, mit glänzend himmelblauem Unterhals d Brust, u. vorderm Theil d Rücks

187. Procnias cyanotropus n. sp. (ampelis cotinaroides v. Temminck) - Ganz schön hell Himmelblau - Unterleib weiß wie bey Procnias ventralis d Berliner Museum.

188. Tringilla nitens Lin. in Pflanzung grade bey Spirito Santo - Chalybea nigra, rostro pedibusque carneis - Moineau du Bresil - / alias v. rous Hausvogel auf Rio -

193. Galbula magna goldgrüner Jacamar - (voll vollig - grandis Gmelin)

197. Rhynchops nigra -

197. Penelope marail - Jacu pemba -

p 189. Hirundo violacea - weiß unter dem Bauch - bey alden velha -

p 236. Caprimulgus aethereus n/p 22 Zoll lang fast ein rostrothlich, dunkelbraun u. weißgrau gefleckt gefiedert. die ob. kleinen Flügeldeckfedern bilden einen weißgrauen Fleck. Ein Querbinde, bazirfarb das Auge das Ende -

p. 239 - Psittacus ochrocephalus Lin - (amazonicus Lath
Le Vaill. pl 110 - Curica - Goldstirn amazon

Q 242. Muscicapa vociferans n/p - Sebastião Sabiah do Matto virgem. (Viruco v. nig.
14 Zoll lang - alles obenan Flügel u. Schwanz dunkelaschgrau u. grünlich - Kehlen Brust dunkelgrünlich od. gelblich ochergrau, Bauch d Unterflügeldeckfedern u. Flügelrandfedern v. innen Flügel fein rost- und blaßroth gelblich
Muscicapa ampelina - Temm.

250. Alcedo bicolor Lath: v. grauer rothbäuchiger Eisvogel

251 Hirundo leucoptera

251 Columba speciosa Tem. Pomba trocaz -
Perdix guyanensis. Capueira.

256. Tinamus brasiliensis – Macuca –
258. Psittacus pulverulentus. L. Turú –
262. Pehelope leucoptera – Jacutinga –
— Tinamus variegatus Latt. Chororão –
— Ampelis atro purpurea nsp. 7 Zoll 9 Li lang
Gefdr bey d. alten Vogel schwärzlich purpurfarb
am Scheitl etwas ins lebhaft rothe übergehend;
Schwungfedern weiß – d. junge Vogel ist schwarz
mit weiß Schwungfedern
263. Psittacus cyanogaster. Sabiaa sicca Gfdr
schön dunkelgrün; am Bauch ein himmelblauer
Fleck – Schnabel weiß; Schwanz etwas verlängert
— Psitt. mitratus. Maitacca mit roth. Kopf
kurzgeschwänzt 7 Zoll 8 Li l, schön lebhaft grün
mit dunkelblauen Schwungfedern, und einem
scharlachroth Ob kopf bis ins Genicke und zu den
Augen herab (vielleicht mein) Cujacuju.
270. Haliaeus forficatus – Grapirà.
275. Ampelis cotinga L. Kirúa – (Crejoã)
— Psittacus melanotus M. Ber. 5 Zoll 9 Li lang
kurz geschwänzt; grün, Brust bauch und Seiten
ins bläuliche fallend; Rücken dunkelschwärzlich kaffee
braun, oder rüß schwarz – Uropyzium beynahe
völlig schwarz; zwey mittl. Schwanzfedern grün mit
rother Wurzelhälfte, die übrigen schön roth mit
breiter schwarzen Spitze – Nakte Haut um
d. Augen meinroth

366. Caprimulgus grandis. L. Mandalua weißlichbunte Nachtsch

366. Strix pulsatrix n. sp., so benannt wegen ihrer Stimme, welche dem Klopfen gleicht. – Ungeöhrt männl. Vogel, 17 Zoll 4 Li lang und 44 Zoll 9 Li breit – größter Theil des Gefieders, von einer angenehm schön hellgrau röthlichbraunen Farbe, an d. Kehle ein weißer Fleck; Scapulaefedern fein dunkler marmorirt, eben so Flügel und Schwanz – Schwungfeder mit dunklern und hellern Querbinden, alle Untere Theile hellgelb, an d. Brust und d. Bauch ins roströthlich gelbe übergehend –

366. Trochilus ater, ein n. sp., ein ~~noch~~ Mas 5 Zoll lang; Schnabel nur wenig gebogen. Körper beynahe schwarz, nur an einigen Stellen stahlblau L. Kupfergrün glänzend; Seiten unter dem Flügel After und Schwanz weiß., am letztern nur ein blau violetter Spitzenraum, mittlere Federn dunkelstahlgrün und stahlblau schillernd

379. Falco haliaetus. L. Fischaar –

280 – Pelecanus aquilus L. Haliaeus Ill –

282. Penelope Parraqua Temink – Aracuan
dieser Vogel scheint wohl beym ersten Anblick mit d. Parraqua eine Art auszumachen; doch ist er ohne zweifl. eine besondere Species – da er kleiner ist vielleicht ist er Humbolts Phasianus garrulus

297. Nectarinia flaveola. (Certhia flaveola Li)
— Sylvia trichas d. grüne Sänger –
— Falco crotophagus – Caracara – sucht d. Insekten auf d. Rücken d. Thiere – Chimachima des Azara

301. Columba rufina – Pucaçu – Caçaroba –

319. am Fluß Belmonte ist Rhychops nigra

302. Numenius Carauna Lath – carão –

322. Psittacus severus. Anacan –
— Sterna flavirostris – Seeschwalbe gelb Schnabel
— Anas virgata n. sp. von rostgelblichem Gefieder ganzer innerer Flügel schwarz, erste Schwungfeder mit weißen Schäften; kein Spiegel; Seitenfedern des Körpers mit einem gelblichweißen Längsstrich; ganze Länge des Männl. Vogels 17 Z. 9 Li

326. Perdix guianensis Lath – Perd: dentata Tem. Capucina

328. Palamedea cornuta L. – Anhuma – ruft wie d. Holztaube.

34. Oriolus persicus – Japui

340 – Tanagra brasilia Tijé Piranga –

345. Hirund. melanoleuca. n. sp. – mit gabelförmigen Schwanze, schwarzem Oberleibe und weißem Unterleibe – eine schwarze Binde unter d. Kehle ganze lang 5 Zoll 4½ Li –

345 – Fl. jugularis, mit hellroströthlich. Kehle und blaßgelblichem Unterleib. ist warscheinl. Axaras Hirond. a ventre jaunatre.

— Muscicapa rupestris n. sp. 6 Z 11 L. alle Obtheile des gefdrs dunkelgraubraun, die untern so wie d. Schwanzdeckfedern hellrostroth; Schwanzfed. rostroth mit breiten schwarzbraunen Spitzen; flügeldeckfedern schwarzbraun, mit 2 unregelmäßig rostrothe Querbinden streifen

360 – Falco tyrannus – n. sp. ms. 26 Zoll 7 Li
Federn d. Hinterkopfs verlängert und aufgerichtet – Hinterkopf. Hinterhals, Seiten des Halses und Obrik mit Federn bedeckt, welche weiß mit schwarzbraunen Spitzen sind, die sich aber decken, und die weiße Farbe verstecken; der ganze übrige Kopf schwarzbraun groß flügeldeckfed. etwas weißlich gezeichnet, Schwanzfed. mit einigen graubraunen, dunklen marmorirten Querbinden, der starke breite Schwanz mit 4 weißlichen graubraunen marmorirten Querbinden Fed. der Hinkel Füße Untereib. Aft. u. Lüsse schwarzbraun mit weißen Querlinien

Fest bis auf d. Jha [illegible]

Bufa bimaculatus – (Rana musica?) mit 2 dunklen Feldern auf d. Rücken

Lacerta Teguixin Li. groß Eyd. Teju –

Colub. fulvius – Li. Cobra coral –

95 – plumbeus n. sp. Läng – 6 f. 13. 4 L.

224 Bauchsch. – 79 Paar Schwanzschuppen – die obern Theile sind dunkel bleyfarben, die untern schön gelblich weiß, wie Porzelain glänzend

106. Stellio torquatus – Stellio Spectr. Palco Daud. – länglicht schwarzer Fleck an d. Seite d. Halses vor d. Schulter, drey dunkle Streifen, welche in perpendikulärer Richtung ins d. geschlossenen Augenlied herablaufen.

177. Surucucu. Lachesis – mutus Daudin – Crot. mutus Linn. ~~Daud~~

181. Coluber bicarinatus – jeder Seite des Rückens eine Reih. gekielter Schuppen – Bauchschild 155 – Paar Schwanzschuppen – 137 – dunkelolivengrün Unterseit. gelb –

188. Caninana – Spr. Santo – wahrscheinlich Merrems. veränderlich. Natter

202. Hyla luteola n. sp. blaßgelblich farb mit einem dunklern Striche durch das Auge auf Bromelien Stauden, in dem daselbst befindlich Wasser –

220. Testudo mydas –

257. Jararacca. Vipera atrox – sie unterscheidet
sich aber von den Vipern durch die Bakenöffnung
welche bey allen sie d'amerikanisch giftschlangen, die ich zu
untersuchen Gelegenheit fand, gefunden wird.
H. Tilesius giebt Notiz von v. Jararacca zu S. Catharina –
Jararaccussu ist bloß ein alter Thier dieser art –

257. Coluber formosus n. sp. 32 Zoll 5 L. lang der
Schwanz nimmt 7 Zoll weg. 202 Bauchsch. 66. paar Schwanzschiff
Kopf lebhaft orangefarben. Iris zinoberroth
Mund 76 Zähne – Vorder Hälfte des Körpers mit schwarzen
und blaßgelbgrünen Querbinden abwechselnd. hinter
Hälfte desselben mit schwarzen und breiten hoch
zinoberrothen Binden abwechselnd –

(unschädlich)

263. Testudo tabulata. Jabuti – Waldschildkrot

276. Boa constrictor Daudin – Jiboya

359. Boa anaconda daud – Sacurice

Simia Rosalia - Marikina Sahui vermelho -

Psittacus Macavuana -

Seiurus aestuans

Simia fatuellus = Mico - gehörnte Sahui -

Bradypus torquatus Illig. Weg nach Cabo frio

Stentor. (od. Mycetes ursinus.) brüllaff Guariba

p 92 - Ateles hypoxanthus - Mono - mit langen Gliedern und starken langen Schwanz. - Haar fahl graugelblich an der Wurzel des Schwanzes oft gelbroth gefärbt - Gesicht fleischfarben - mit schwärzlichen Punkten und Flecken bestreut. Ganze Länge von d. Nasenspitze bis zu. End des Schwanzes, 46 Zoll 8 Li - der Daum der Vorderhände ist nur ein kurzes Rudiment. - Hiedurch unterscheidet sich diese Art von dem arachnoides des H. Geoffroy welch. der Daumen gänzlich fehlt -

110 - Curucau rasé Azara V. IV. p 222. - Ibis mit den nackten fleischrothen Gesicht. -

110 Falco palustris: 19 Zoll

164. Lutra brasiliensis - Lontra - in d. Hauptflüsse des innern Brasiliens erreichen diese Thiere eine colossale Größe, und man nennt sie alsdann Ariranha -

164. Calithrix personata Geoffr. Saüassu - (Saa) - Kopf & 4 Hände schwarz, der leib fahl weiß graubräunlich - der lange schlaffe Schwanz gelbröthlich

p. 187. Jacchus leucocephalus. Geoffroy. (Sahuim.)

p. 187. Couy. d'Azara. Stachelschwein mit d. Rollschwanz.

218. Myrmecoph. jubata. Tamandua cavallo –

222. Felis brasiliensis Saguarété noir. d'Az –

245. Bradypus Idactylus

257. Vespertilio naso. n. sp. mit stark verlängerter beynahe rüsselartiger Nase, welche um eine starke Linie, über d. Oberkiefer hervortritt – ganz lange d. Ohr 2 Zoll 4 Li – Flughaut starkbehaart – Äußeres Ohr schmal und stark zugespitzt – Haare am Oberkopf dunkelgelblichbraun, an d. Unth. blaßer gelblich grau.

256. Caelogenys. Pacca – d. Paka.
– Dasyprocta aguti – Aguti –
Tatu noir d'Azara. gemeine Tatu

258. Callithrix melanochir: ~~35~~ Sigó – 35 Zoll lang 10 Li – wovon der Schwanz 21 Zoll 10 Li wegnimmt. Haar lang dicht und sanft; Gesicht und 4 Hände schwarz. Haar schwärzlich und weißlich melirt, es erscheint daher aschgrau; Rücken röthlich kastanienbraun. Der Schwanz ist weißlich, oft beynahe weiß auch zuweilen gelblich gefärbt

261. Dicotyles labiatus Cuv:

262. Felis pardalis Mbaracaya
– tigrina ? Gatto pintado
– Yaguarundi – muriseo –

291. Phylostomus spectrum – Guandirà –

300. Felis onca Li. Varietät d. man in Bahia Cangussù nennt, und welche sich durch eine größere Anzahl von Flecken auszeichnet.

324. Jachus penicillatus Geoffr. – Sahui –

– Simia jachus Li. bey Bahia –

325. rothe Unze – Felis concolor – Çuçuaranna –

371. Cebus xanthosternos, n. sp. mit starken schwarzbraunen Gliedern und Rollschwanz, dickem Kopf mit schwarzen Bakenbarte, bräunlichen Körper und gelblichen Brust und Unterhalt, ganze Länge 32 Zoll 8 Li., wovon d. Schwanz 17 Zoll, 7 Li. wegnimmt Macaco di bando.



Schiessl 818 № 3.

Pr. 16. Apr. 1815

Ostl.

Kreisamt

67

Neustadtley W: Oberamt

Erstattet Bericht
ad Nrum 58. die
Entstehung der
weißen Dohlen bes:

Mit k. kreisämtl. Einbeglei-
tung.

Sp

Hohllöblich k. k. Kreisamt!

In Gemäßheit der k. kreisamtlichen Verordnung vom 11ten d. Mts No. 58. wird der Bericht erstattet: daß der hiesige Rentmeister Anton Werner vor 2. Jahren auf Verlautbarung seiner in Österreich auf Besuch gewesenen Frau, weiße Dohlen von hier an den gewesenen Stratzinger Pfarrer Kratky, der ihn hierum aus Vorliebe für Naturseltenheiten ersucht hatte, geschickt – und dieser solche wahrscheinlich durch einen Schmieden Nahmens Holl an den Wiener Naturalien Kabinets Direktor eingesendet habe, wodurch dieser Bothe als ursprünglicher Veranlasser dieser Einsendung vermuthet worden seyn mag; denn es existirt weder auf der Herrschaft, noch in der Stadt Neustadtl ein Schmied mit Nahmen Holl.

Indessen kann das gefertigte W: Oberamt die verläßliche Auskunft ertheilen: daß die Entstehung der weißen Dohlen, die hier wirklich manchmal in den Nestern vorgefunden werden, blos ein Spiel der Natur sey, und vielleicht,

[illegible] Linie hätten sämtliche [illegible] auch
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

hätte Einfluß / auch
in größerer Menge
werden möchten, wenn
hier durch eigens ange-
hohen Bäumen mehr
, und beobachten möchte,
mit Fleiß wie die
verfertigte an hohen
hölzerne Höhlungen
nisten, sodann mit
zigen Jungen, die
gebraucht, und bei
auch weiße, jedoch äußerst
schäckige gefunden, diese
aufgezogen.
ter den alten Dohlen
deckt, und es besteht
Gattung dieser wider-
, vielmehr ist zu ver-
darum weil man alte
gends sieht, die Eltern
ihr weißes Junge
chlecht nicht gehöriges
gewissen Alters ge-
es die Spatzen mit
Freyen zu thun
kann man mit Grunde
eine solche weiße Dohle
die schwarzen sich sogleich
umjagen, und zu ver-

nichten, trachten; übrigens kann man
mit Überzeugung nicht angeben, was
auf die Entstehung der weißen Farbe
bei Fortpflanzung der Dohlen Einfluß
habe; obzwar das gemeine Volk glaubt,
daß es durch Paarung mit Tauben ge-
schehen müsse, worüber aber eben so
wenig ein Beweis vorliegt, als schon
die Natur der Verschiedenheit dieser Vögel
die Formation ihres Schnabels, ihrer
Nahrung, und ihrer Brutzeit gegen
diese Hypothese streiten.
Oberamt Neustadl am 14. April
1815.

Merfort
Direktor.

Nro 67.

Hochlöblich k. k. Landespräsidium!

Wird zur Entsprechung des hohen Auftrags vom 8/10.
d. Mts. Zahl 1628 mit dem gehorsamsten Bemerken
einbegleitet, daß es nicht allein auf der Herrschaft
Neustadl, wie das Wirthschaftsamt anführt, sondern bey-
nahe im ganzen Iglauer Kreis üblich sey, die Dohlen, Tauben u. dgl.
Vögel durch eigens auf hohen Bäumen angebrachte Nester
oder hölzernen Höhlungen zum nisten zu loken.
Iglau den 17ten April 815.

[illegible]

A List of british birds. out of Montagu's
Ornithological Dictionary.

Rapacious.

Falco

Chrysaetos. Golden Eagle. is suspected to be mor rare than it is generally imagined

ossifragus. Sea Eagle — common in Scotland and Ireland on the sea coasts.

fulvus. Ringtail Eagle. is rarely found in South Britain.

albicilla. Cinereous Eagle. not uncommon in Scotland & th orkyes

Haliaetos. Osprey. is frequently found about the Lake of Killarney in Ireland.

buteo, common Buzzard. common

apivorus. Honey Buzzard. rare.

aeruginosus. Moor Buzzard — common about the sandy flats on the coast of carmarthenshire.

palumbarius. Goshawk — rarely found in England, but not uncommon in Scotland.

milvus. Kite — common

gentilis. Gentil Falcon. a doubtfull species.

peregrinus. Peregrine Falcon. is not uncommon upon the roky coast

? versicolor. Li. Spotted Falcon. ~~the~~ two of this birds were shot at Longnor in Shropshire. an F. albidus?

lagopus. Rough legged Falc. = is rarely met with in England

? griseus. Grey Falcon. one single ~~int~~ specimen was shot near Halifax 1762.

islandicus. Ser falcon. north of Scotland.

lanarius. Lanner. — rarely met with in England.

cyaneus. Flen-harrier. — not uncommon in England.

tinnunculus. Kestrel. — much common.

nisus. Sparrowhawk. — very common.

subbuteo. Hobby — not uncommon.

aesalon. Merlin — breeds in Northumberland.

n. sp. cineraceus M. ont: Ash coulourd Fal. one spec: was shot.

Strix.

bubo. Great-eared Owl. rarely met with in England.

otus. Long eared Owl. frequently

flammea. White Owl. common

stridula. Tawny Owl. plentiful in Engl.

passerina. Little Owl. very rare.

brachyotos. Short-eared Owl. common.

Lanius
excubitor. Great cinereous Shrike - a scarce bird in Engl.
collurio. Redbaked Shrike - common
rutilus. Wood Chat. very rare.

Corvus.
corax. Raven —— common
corone. Crow. Carrion Crow - common.
frugilegus. Rook. — common.
cornix. Hooded Crow. common
monedula. Jakdaw. —
glandarius. Jay. — plentiful
pica. Magpie. —
graculus. Red-legged Crow. not rare.
Caryocatactes, Nutcraker. rare species

Coracias
garulfa. Garrulus Roller. is a rare bird

Oriolus galbula. Golden Oriole. rare.

Cuculus canorus common Cuckow. common.

Yunx
torquilla Wryneck. not uncommon in the southern and eastern parts of Engl. but is mor scare westward

Picus.
martius Great Bl: Woodpecker. is given as a br: bird with consid: doubt.
major. Greater spotted W. common
medius Middle spotted. W. —— do.
Minor. Lesser spotted W. scarce
viridis. Green Wood: not uncomon
villosus. Hairy Wood: in the north of England.

Alcedo
ispida Common Kingsfisher. common

Sitta
europaea European Nuthach common

Merops
apiaster Com: Beeeater. very rare

Upupa
epops, Com: Hoopoe. rare.

Certhia familiaris. C: Creeper. common

Sturnus
vulgaris. Com: Stare. common.

Turdus
viscivorus. Missel T
musicus. Throstle.
pilaris. Fieldfare
iliacus. Redwing.
merula. Blackbird
torquatus. Ring Ou
cinclus. Water Ou
roseus. Rose coloured

Ampelis
garrulus. Waxen Ch

Loxia
curvirostra. Com: Cr
coccothraustes. Hawfi
enucleator Pine Gr
chloria. Greenfinch
Pyrrhula. Bulfin

Emberiza
miliaria Com: Bu
citrinella Yellow B
schoeniclus. Reed
nivalis. Snow B
glacialis Tawny
montana. Mountin
Sunstalli. Greenhea
Cirlus. Cirl Bun

Fringilla.
domestica. House Spe
montana. Tree Sp
caelebs. Chaffinch
montifringilla. Bra
carduelis. Goldfin
Spinus. Siskin.
linota. Common l
cannabina greater
linaria lesser Red
montium. Twite.

a scarce bird in Engl.
on
e.
)
mon.
.
ful
are.
ecies
i rare bird
.
on.
mmon in the southern and eastern
Engl. but is mor scare westward
as a br: bird with consid: doubt.
on
n.
common
north of England.
n
n
rare
on
.

Turdus
viscivorus. Missel Thrush — is by no means plentiful in Engla
musicus. Throstle. — common
pilaris. Fieldfare. — from October till april
iliacus. Redwing. — ditto.
merula. Blackbird. — common
torquatus. Ring Ouzel. — not common
cinclus. Water Ouzel. — not unfrequent.
roseus. Rose coloured Thrush. is rarely met with in Engl: in Lancashire.

Ampelis
garrulus. Waxen Chatterer. not very frequently

Loxia
curvirostra. Com: Crossbill. — common.
coccothraustes. Hawfinch. — not common
enucleator Pine Grosbeak. in the most northern parts and not com
chloria. Greenfinch. — common
Pyrrhula. Bulfinch. — common.

Emberiza
miliaria Com: Bunting. common
citrinella Yellow Bunting. much common
schoeniclus. Reed Bunting. common
nivalis. Snow Bunting — Scotland. in large floks Winter time
glacialis Tawny Bunting rare bird
montana. Mounting. Bun. is said to be found in Yorkshire
Sunstalli. Greenheaded. B. two specimens. doubtful
Cirlus. Cirl Bunting. — common in the West of Engl:

Fringilla.
domestica. House Sparrow. common.
montana. Tree Sparrow. —
caelebs. Chaffinch. — comm.
montifringilla. Brambling — frequently in Winter
carduelis. Goldfinch. — common
Spinus. Siskin. —
{linota. common linnet. — } common
{cannabina greater Redpole.
linaria lesser Redpole — common
montium. Twite. — is gregarious, accompanying the linnet in large floks flights

Muscicapa

grisola.	Spotted Flycatcher	common.
~~Pied~~ atricapilla.	Pied Flycatcher	is by no means plentiful.

Alauda

arvensis.	Sky-lark.	common
arborea.	Wood-Lark.	
rubra.	Red-Lark.	a rare species.
cristatella.	Lesser crested Lark.	nemorosa. is given as a doubtful spec.
minor.	Field-Lark.	Alauda trivialis nobis is by no means plentiful
pratensis.	Tit-Lark.	common.
trivialis.	Pipit-Lark	al: campestris. is frequently in autumn.
petrosus.	Rok. Lark.	plentiful.

Motacilla

alba.	White Wagtail	common.
boarula.	Grey. W—	common.
flava.	Yellow. Wagtail	not rare

Sylvia

luscinia.	Nightingale	common
hortensis.	Greater Pettichaps	not very plentiful
hippolais.	Lesser Pettichaps.	Sylv. rufa Brekst. common bird.
modularis.	Hedge Warbler.	is found in all parts of England.
cinerea.	White-throat	very common.
Sylviella.	Lesser White-throat	Sylv. curruca. is more in the eastern Part
locustella	Grashopper-Warbler	is not plentiful.
salicaria	Sedge. Warbler.	Sylvia nisi S. phragmitis. is a frequent bird
dartfordiensis	Dartford-W.	a scarce bird.
rubecula.	Redbreast.	common.
oenanthe.	Wheat-ear.	common.
rubicola.	Stone-Chat.	is a general bird
rubetra	Whin-Chat.	common
troglodytes	Common Wren.	common
regulus	Goldcrested Wren.	common
trochilus	Yellow Wren	plentiful species in some parts.
sylvicola.	Wood Wren	not uncommon.
arundinacea	Reed. Wren	not very common.
phoenicurus.	Red Start.	common
atricapilla.	Blakcaps.	not uncommon.

Parus.
major. great Titmouse. — common.
palustris, Marsh Titmouse. — is more plentiful than the Colemouse.
ater. Colemouse — — common.
caruleus. blue Titmouse — common.
caudatus. Longtailed Titmouse — common.
biarmicus. Bearded Titmouse. not uncommon.
cristatus. Crested Titmouse in the north of Scotland.

Hirundo
rustica Chimney Swallow — very common.
urbica. Martin — = detto.
riparia Sand Martin — not so plentiful than the precedents
apus — Swift — common.

Caprimulgus
europaeus. European Goatsucker. plentiful.

Columba
palumbus, Ring-dove — common.
oenas. Rock dove. — scheint Col. livia zu seyn. common.
turtur. Turtle-dove. — not rare.

Phasianus
colchicus. Common Pheasant — common.

Tetrao
urogallus. Wood Grous — not uncommon.
tetrix. Black Grous. — common in the northern parts.
scoticus. Red Grous. — not uncommon.
lagopus. Ptarmigan. — not uncommon.
hybridus, hybridous grous. is said to have been formerly met with in Scotland.

Perdix
cinerea. Common Partridge. very common.
rufa — Guernsey Part. — is doubted if it be a British species
Coturnix. Quail — common.

Otis
tarda. Great Bustard. rare.
tetrax little Bustard — very rare.
oedicnemus. Thik-Kneed. B. not uncommon.

Platalea
leucorodia White Spoonbill. is rarely met with in England.

Ardea.
cinerea. Common Heron. — common.
grus. Crane. — rare bird
ciconia. White Stork. — ~~very~~ rare.
alba. Great White Heron. — one was killed in Cumberland.
nicticorax. Night Heron. — one instance was shot in Engl.
caspica. African Heron. — two spec: were shot in England.
stellaris. Bittern. — is not plentiful
minuta — little bittern — very rare bird.
garzetta. Egret. — one instance
Gardeni. gardenian Heron. one speci: was shot

Tantalus
igneus. Glossy Ibis. — one or two instances.

Numenius.
arquata — Common Curlew. common.
phaeopus. Whimbrel — not common.
pygmaeus. Pygmy Curlew — very rare.

Scolopax
rusticola. Woodcock. — common
major. great Snipe. — rarely met with in Engl.
grisea. brown Snipe — one specimen was shot in Engl.
gallinago. Common Snipe. plentiful
gallinula. Sak. Snipe — not rare.
limosa. Sardreka Snipe — Wintertracht. rarely.
totanus. Spotted Snipe. not common
aegocephala. Common Godwit. ist die Lapponica des Linné, das ganze Jahr in England.
lapponica, red Godwit. ist limosa Sommerkleid. ist sehr selten
canescens. cinereous Godwit. one instance perhaps Scolop: glottis Bech
Cantabrigiensis. Cambridge G. one instance
glottis. Greenshank. — not very common
calidris. Redshank. — not uncommon.

Tringa
pugnax. Ruff.
vanellus. Lapwing
gambetta. Gamet
Squatarola. Grey Sa
cinerea, ashcoloured
ochropus Green Sa
hypoleucos. Common
macularia. Spotted
islandica. Red Sa
pusilla. little Sa
glareola, Wood Sa
cinclus. Purre.
alpina. Dunlin
canutus. Knot
interpres. Turne
grenovicensis. Green
lincolniensis. Bla
fusca. brown S
nigricans. Purple
flavipes. Yellow legge
the Hebridal Sandpiper

Charadrius
pluvialis. Gold
morinellus. Do
Hiaticula. Rin
Calidris. San
Himantopus Long
Cursor. Cream
den Char. can

Haematopus.
ostralegus. Pie

Rallus aquaticus. Wa

Tringa

pugnax. Ruff. —— common.
vanellus. Lapwing —— is common.
gambetta. Gamet —— is a very rare bird, and differs fr. T. Calid.
Squatarola. Grey Sandpiper. is not plentiful.
cinerea, ashcoloured Sandp. is a common bird in Winters time.
ochropus Green Sandpiper — not plentiful.
hypoleucos. Common Sandp. — common.
macularia. Spotted Sandp. very rare.
islandica. Red Sandp. not very common.
pusilla. Little Sandp. is Fr. Temninkii L. extremly rare
glareola, Wood Sandp: rare. —
cinclus. Purre. —— common in Winter.
alpina. Dunlin —— not so plentiful as the Purre
canutus. Knot — —— common in Lincolnshire
interpres. Turnestone —— not common.
grenovicensis. Greenwich San. one specimen was killed at Greenwich
lincolniensis. Blak Sandp: one specimen was shot in Lincolnshire
fusca. brown S. in the Collect. of Mr Tunstall, doubtful.
nigricans. Purple Sandp:. very rare.
flavipes. Yellow legged Snipe. one specimen only on record
the Hebridal Sandpiper of Pennant is only a variety of the Turnestone

Charadrius

pluvialis. Golden Plover. common.
morinellus. Dotterel.
Hiaticula. Ringed Plover. der große ist gemein,
Calidris. Sanderling. common
Himantopus Longlegged Plo. very rare.
Cursor. Cream-coloured Pl. very rare.
den Char. cantianus hält Montagu für eine Var. des Hiat.

Haematopus.

ostralegus. Pied. Oystercatcher common.

Rallus aquaticus. Water-Rail. not plentiful.

Gallinula		
Crex.	Crake Gallinule	plentiful
Chloropus.	Common ——	common.
Porzana.	Spotted Gallinule	a scarce bird.
Phalaropus.		
hyperboreus.	Red Phalarope	a rare.
lobatus.	Grey Phalarope	scarce bird.
Fulica		
atra.	common Coot.	common.
aterrima.	Greater Coot.	doubtful.
Podiceps.		
cristatus	Crested Grebe.	common
obscurus.	Dusky Grebe.	common in Devonshire
auritus.	Eared Grebe.	Inhabits Lincolnshire.
rubricollis.	Red-necked Gr.	a rare bird.
minor.	Little Grebe	much common
Hebridicus.	Black-chin Grebe	inhabits Tiree one of the Hebrides
Cornutus.	Sclavonian Gr.	very rare
Recurvirostra		
Avocetta.	Scooping Avoset.	not uncommon.
Alca		
impennis.	Great Auk.	in the most northern parts of the Kingd
torda.	Razor-billed Auk.	common.
pica.	Black-billed Auk.	is found in Winter on the coasts
arctica	Puffin.	—— common.
alle.	Little Auk.	not frequently met with in Engl.
Uria.		
Troile	Foolish Guillemot	common.
minor.	Lesser. ——	is sparingly found.
grylle.	Black.	not uncommon in the north of Engl.
Colymbus.		
glacialis.	Northern Diver.	rare
Immer.	Imber Diver.	is common in Scotland.
stellatus.	Speckled Div.	is the most common species.
arcticus.	Blackthrooted D.	is rarely found in England
septentrionalis.	Red-throated D.	rare
Sterna.		
Boisii.	Sandwich Tern.	common.
Hirundo.	Common Tern.	much plentiful
Minuta.	Lesser. ——	no less numerous than the preceding
fissipes	Black Tern.	common
Obscura.	Brown Tern.	doubtful.

Larus

parasiticus.	arctic Gull	in the Orknies not uncommon
ridibundus.	blakheaded Gull.	common
Crepidatus.	blaktoed Gull.	rare.
ridib? Erythropus	Brown. headed. G.	niun Lar. ridibundus.
canus.	Common Gull.	most plentiful.
marinus.	Great blakbaked	not very plentiful
argentatus.	Less. blakbaked	less numerous than the Herring Gull
fuscus.	Herring Gull.	is plentiful
atricilla	Laughing Gull.	rare.
? cinerarius	Red legged.	ist Lar. ridib.
catarractes.	Skua Gull.	in the Orkneys.
tridactylus	Tarrok. Gull.	ist einerlei mit Lar. rissa
Naevius	Wagel Gull.	ist der Jungen von fuscus marinus und arg.
hybernus	Winter Gull.	~~con~~ ist Lar. canus im 2t Jahr.
rissa.	Rissa (Kittiwake)	common

Procellaria

glacialis	Fulmar Petrel	in the Orknies.
puffinus.	Shearwater P.	in the Orkney & Islands.
pelagica.	Stormy Petrel.	rare

Mergus.

merganser.	Goos ander	not uncommon in Winter
castor.	Dun-diver.	common.
serrator.	Red breasted. Merg	appears sometimes in Winter
albellus.	Swew.	not frequently met with. in Wint
minutus.	Minute Merganser	detto.

Anas.

cygnus.	Whistling Swan.	rare.
anser.	Grey lag-Goose.	in Lincolnshire.
ruficollis	red breasted. G.	two instances
albifrons	white-fronted.	more plentiful than the Bean Go.
segetum.	Bean Goos	common in Winter.
Erythropus	Bernacle G.	plentiful in & Ireland
bernicla.	Brent goose.	plentif in Ireland & on the West coast
mollissima	Eider. Duk.	North of Scotland rarely in the South.
fusca.	Velvet Duk	not common.
nigra.	Scoter.	rare.
boschas.	Common Wild D.	common.
tadorna	Shieldrake.	not uncommon.
marila	Scaup Duk.	not uncommon.
clypeata.	Shoveler.	not common. indeed a rare bin
rubens.	redbreasted Shoveler.	rare.

18 / 20

Anas

ferruginea.	ferruginous Duk.	one spec.
glocitans.	Bimaculated D.	one spec:
Strepera.	~~Wigeon~~. Gadwall	not plentiful
penelope.	~~Pochard~~ Wigeon	visits England in Autumn.
ferina.	Pochard. —	common in Winter
acuta.	Pintail Duk. —	common.
glacialis	Longtailed D.	rare in England.
Clangula	Golden. Eye.	not uncommon
Glaucion	Morillon —	ist nun clangula
Fuligula.	Tufted Duk.	not uncommon.
Querquedula	Garganey.	not plentiful
Crecca.	Teal. —	common in Winter
histrionica.	Harlequin D.	Scotland. rare b.
spectabilis.	King. Duk.	Orkney Islands.

Pelecanus.

Carbo	Corvorant —	common.
graculus	Shag —	common.
bassanus.	Gannet —	plentiful in the Orknies

1 Tertiär – der gewöhnlich – Dist. im Mag. &
groß – auf
1 zerschnitt Ankerwurm

18 1 f – viele sehr kl. Wunden im Magen und Fraß
und sehr viele kleine Distomen an d. Wand des
Magens fest einige große ebenfalls, und
am Ende des Mastdarmes –

20 1 – f – 1 ankerw. am Anf. des Blindarmes –
viele kl. Wund. W. im Magen und Fraß – Distom
~~[illegible]~~ colub. kupferroth mas –

25 1 f, gewöhnl. Dist. groß Mag. im Mastdarm
13 schmale lange Dist. im Blindarm

27. Jacaréguaçu – Pentast –
asc. vent –

28 Surucuú 1 ms –

großschildb. 1 f – Dist. im Mag. & kl. Wundsteine
2 Ankerwürmer am Ende des lang. Magens
~~[illegible]~~ mehr Dist. im Mastd.

14 Myothera 1111	9 Dendrealgst 1111	12 Turdus 11	13 Tanagr. 11	8 Rhamphastos 1	1 Tulco 1. real 1 11
15. Rhamnophilus 1111111	4 Picus 1	16 ampelis 1 carnifex 1 cayana	17 Muscicap. 1111	3 Pontanus 1. vultur. 1. curica 1	
18 Columba 1	5 Cuculus 1	6 Galbula 111	7 Bucco. 11	10 anabates 1	
19. Tinamus 11	20 Caprim 1	21 Loxia 1	2 Strix 1	11 oriolus. 1	

Ill.mo Snr Doutor João Natterer

O Machadinho não se sabe de que Gentio he p.r isso aparesse pellos abituaçoens delles q entro tempo ella presziestenho julgasse a ser isso do Jentio Maraua em q.to Pellaõ de Pedra não tenho nem nunca se cunstou q Jentio tivesse pellaõ de pedra he o que se me ofreçe a dizer a V. S.a D.s G.e a V. S.a

p.r m.s an.s Sau

De V. S.a V.or & C.ro

Fran.co Xav.r de Sa


Quadrumana.
1
Galopithecus
Lemur.
Pteropus.
Cheiroptera.
2.
Vespertilio
Tupaia.
Soreæ.
Gymnura.
Insectivora
3.
Centetes.
Cercoleptes.
Carnivora
4
Mydaus.
Phoca.
Cetacea.
5.
Sus.
Manatus.
Pachydermata.
6.
Elephas.
Equus.
Camelus.
Ruminantia.
7
Rodentia.
9.
Lepus
Lagostomus.
Megatherium
Bradypus.
Edentata
8
Phascolomys
Marsupialia.
10.
Monotremata.

Genus. I

Vultur.

cinereus.

Vultur. .. Brisson Orn. I p 453 n 1. (Hat aber keine ganz befiederte Füße)

? ~~Vultur arabicus Kreß. Apparat. p 29 n~~ 14

V. cinereus Gml Linné p 247. n. 6. hat den nähmlichen Fehler nach geschrieben.

Vautour Buffon H. n. 1 p 123 (p 158) planch enlum. n 425 diese Abbildung ist sehr genau

Latham Synops. Cinereous Vulture p 14 n 8. sagt auch fälschlich, daß die Füße bis an die Zehen befiedert wären.

Vult. cinereus. Lath Ind. Orn. I p. 1 n 2.

Gemeiner Geyer. V. cinereus Bechst. Taf. 1 p 2 n 1.

Grauer Geyer V. cine. Bechst. Naturgesch Deutschl. 2 Aufl 2. p 472 n 1. Tafel VIII diese Abbildung ist so ziemlich gut gerathen.

Vultur fulvus.

— Brisson Ornitho I p. 462 n 7. Größer als ein Adler 3 Sch. 6 Zoll Paris. Maaß. Schnabel bis an die Mundwinkel 4 Zoll 3 Li.

Grifon Buffon Vl. I p 118 (p 151.) —

Percnoptere Buffon. I p 116) (149) planch. 426. diese Abbildung ist sehr genau.

Fulvous Vulture Latham Synop. I p 17. n 11. Hat bloß dem Brisson nachgeschrieben

Vult. fulvus Gmelin. Linné I p 249 n 11.

— — Latham Index: Orn. I p. 6 n 12.

Alpengeyer. V. trencalos Bechst. Nat. I p 491. n 3 er beschrieb richtig unsern Vogel aber vermehrte ohne Noth das System mit einem neuen Namen.

Weißköpfiger Geyer V. leucocept. Bechst. Nat. I p 480 n 2. die genauere Beschreibung des H. v Minckwitz ist bloß von einem fulvus genommen, welches klar in die Augen ~~springt~~ fällt, wenn man sie nur durchliest und die ~~Größe~~ Länge von 4 f. 2 Zoll betrachtet. die Citate des Gmelin Buffon Cetti und Klein stehen daher am unrechten Orte

Vultur alpinus. Brisson Or I. p 464. n 8. ist offenbar mit unsern einerley.

Vultur percnopterus. Hasselquist. iter p 209.

— Vultur fuscus Brisson Ornith I p. 455. Jünger Vogel oder Alter Vogel Länge 2 f. 6 Li. Schnabel bis an den Mundwinkel 2 Zoll 6 Li.

Vautour brun (Buffo. I p 161 (p 130) Vautour de Malte planche 427 ist wahrscheinlich ein junger Vogel

Vult. fuscus Gmelin I p 248 n 8.

Maltese Vulture Latham Synops I p 15 n 9.

V. fuscus. Lath. ~~Synops.~~ Index I pag 5. n 10.

— V. aegyptius Briss. I p 457. n 3. Achbobba des Thaw.

Sacre de Egypte. Buff I p 167 (130).

— Vult. leucocephalus Gmel. Li. I p 248 n 10.

(V. leucocephalos Brisson I p 466 n 9 dieß ist ganz bestimmt kein Vult. sondern ist F. lagopus Bechstein vermuthete schon p 484 dieser Vögel möchte der Steinadler seyn ist es aber nicht.)

Vautour de Norvege Buffon I p. 164 (128) planche ent 429. diese Abbildung ist ~~sehr gut~~ ziemlich ~~mir~~ die Füße sollten gelb seyn.

Ash coloured Vulture Latham Synops I p 13 Brisson's citat und Beschreibung muß wegfallen

— V. percnopterus Gmel. Linne I p 249 n 7.

— — Lath. Index Orn I p 2 n 3 die citate des Buffon und Lath Synops fallen weg.

— Gingi Vulture Lath. Synops. Suppl. I p 7 n 23.

Vultur gingianus Lath. Index I p 7 n. 16.

L'Ourigourap Le Vaillant Oiseaux d'Afrique I p 62

planch. enl. 14.

Nach diesen Naturforschern bleibt kein Zweifel übrig, daß nicht dieser Vogel mit unserm Percnopt. einerley sey, da er den Vautour de Norvege von welchem Buffon die Zeichnung nahm, genau mit seinem Ourigourap verglich, und beyde für ein Art erklärte. Vaillant rechnet aber auch den leucocephal. des Brisson dazu, welches ein offenbarer Irrthum ist, da Brisson ganz gewiß einen noch ungemauserten F. lagopus vor sich hatte.